



**PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS**

ENFERMAGEM

31. As causas da acidose respiratória podem ser agudas ou crônicas. Sobre as causas de acidose respiratória aguda em pacientes gravemente enfermos. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Obstrução de vias aéreas decorrente de vômito com aspiração, broncoespasmo e laringoespasmo.
- II. Hemo ou pneumotórax, tórax instável e Síndrome da Angústia Respiratória no Adulto (SARA).
- III. Obstrução de vias aéreas decorrente de enfisema pulmonar.
- IV. Depressão do centro respiratório causado por tumor cerebral.

- (A) Somente I e III estão corretas.
- (B) Somente II e III estão corretas.
- (C) Somente I e II estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas

32. Em relação às manifestações clínicas de um paciente crítico com insuficiência respiratória por hipercapnia ou por hipoxemia, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

		Manifestações Clínicas
1. Hipercapnia	()	Hipertensão
	()	Letargia
2. Hipoxemia	()	Taquicardia
	()	Cefaléia

- (A) 2 – 1 – 2 – 1
- (B) 1 – 2 – 2 – 1
- (C) 2 – 1 – 1 – 2
- (D) 1 – 1 – 2 – 2
- (E) 2 – 2 – 1 – 1

33. Analise as afirmativas sobre redução de danos da Política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas (BRASIL,2003), colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A abstinência é o único objetivo a ser alcançado.
- () As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta a singularidade e as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas.
- () Traçar com cada usuário estratégias que estão voltadas não para a abstinência como objetivo a ser alcançado, mas para a defesa de sua vida.

- (A) V – V – V
- (B) V – F – V
- (C) F – V – V
- (D) F – F – V
- (E) F – F – F



34. Em relação às fases da doença pela infecção do vírus Chikungunya, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

Fases da doença

1. Aguda
2. Subaguda
3. Crônica

Característica

- () Durante esta fase a febre normalmente desaparece, podendo haver persistência ou agravamento da artralgia, incluindo poliartrite distal, exacerbação da dor articular nas regiões previamente acometidas na primeira fase e tenossinovite hipertrófica subaguda em punhos e tornozelos.
- () Nesta fase há febre de início súbito e surgimento de intensa poliartralgia, geralmente acompanhada de dores nas costas, cefaléia e fadiga, com duração média de sete dias.
- () O sintoma mais comum nesta fase é o acometimento articular persistente ou recidivante nas mesmas articulações atingidas durante a fase inicial, caracterizado por dor com ou sem edema, limitação de movimento, deformidade e ausência de eritema.

- (A) 1 – 2 – 3
(B) 2 – 3 – 1
(C) 1 – 3 – 2
(D) 2 – 1 – 3
(E) 3 – 2 – 1

35. O enfermeiro, assim como, os demais membros da equipe de atenção básica possuem atribuições específicas de acordo com as disposições legais que regulamentam o exercício da profissão. Sobre as atribuições específicas do enfermeiro na atenção básica, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos e atividades em grupo na Unidade Básica de Saúde (UBS).
- (B) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.
- (C) Garantir a estrutura física necessária para o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde.
- (D) Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental e dos equipamentos odontológicos.
- (E) Realizar consulta, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.

36. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo.

A púrpura trombocitopênica idiopática após a vacina contra a _____ é um evento raro cuja relação causal é difícil de ser comprovada.

- (A) poliomielite
(B) hepatite B
(C) difteria
(D) febre amarela
(E) influenza



37. Sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- A ideia central foi desenvolvida de modo articulado com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.
 - A Política de Atenção Integral à Saúde do Homem se estabeleceu mediante um recorte estratégico da população masculina na faixa etária de 15 a 59 anos.
 - A paternidade não deve ser vista apenas do ponto de vista da obrigação legal, mas, sobretudo, como um direito do homem a participar de todo o processo.
 - As enfermidades e agravos da população masculina está concentrada em 4 (quatro) grandes áreas especializadas: cardiologia, ginecologia, gastroenterologia e pneumologia.
- (A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.
38. Sobre a Doença Meningocócica, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- Diferentemente das demais meningites pode apresentar uma evolução mais lenta, de semanas ou meses, tornando difícil o diagnóstico.
 - O modo de transmissão é por contato íntimo de pessoa a pessoa por meio de gotícula das secreções da nasofaringe.
 - Em geral, a evolução é rápida e benigna, sem complicações – exceto nos casos de indivíduos com imunodeficiências.
 - O diagnóstico é realizado por meio do isolamento da *N. meningitidis* do sangue ou líquido.
- (A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.
39. Na consulta de enfermagem para estratificação de risco para doenças cardiovasculares recomenda-se a utilização do escore de Framingham. Sobre os fatores de risco alto que influenciam na estratificação, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- Elevados níveis de PSA.
 - Infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio.
 - Diabetes mellitus.
 - História familiar de doença oncológica.
- (A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.
40. Assinale a alternativa abaixo que corresponde a um fator interveniente na medida da pressão arterial em pessoas idosas que se caracteriza quando, após a ausculta dos sons iniciais, ocorre o desaparecimento dos sons e o seu reaparecimento em níveis pressóricos mais baixos, o que subestima a verdadeira pressão sistólica.
- Pseudo-hipertensão.
 - Hipertensão sistólica isolada.
 - Hiato auscultatório.
 - Hipertensão do avental branco.
 - Osler.



41. De acordo com a Resolução 293 de 21 de setembro de 2004 do Conselho Federal de Enfermagem que fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de Enfermagem nas unidades assistenciais das Instituições de Saúde e Assemelhados, em seu artigo 5º sobre a distribuição percentual do total de profissionais de Enfermagem, é correto afirmar.
- (A) Para assistência mínima e intermediária: de 42 a 46% são Enfermeiros (mínimo de seis) e os demais, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.
 - (B) Para assistência semi-intensiva: de 33 a 37% são Enfermeiros e os demais, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.
 - (C) Para assistência intensiva: de 52 a 56% são Enfermeiros e os demais, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.
 - (D) A distribuição de profissionais por categoria deverá seguir o grupo de pacientes de menor prevalência.
 - (E) Para assistência intensiva: de 52 a 56% são Enfermeiros e os demais, Técnicos de Enfermagem.
42. Assinale a alternativa que indica a etapa do Processo de Enfermagem em que o enfermeiro irá determinar os resultados que se espera alcançar; e as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- (A) Histórico de Enfermagem.
 - (B) Diagnóstico de Enfermagem.
 - (C) Planejamento de Enfermagem.
 - (D) Implementação de Enfermagem.
 - (E) Avaliação.
43. Assinale a alternativa que representa um imunossupressor indicado para pacientes submetidos a transplante de rim.
- (A) Estreptoquinase.
 - (B) Anisidione.
 - (C) Ciclofosfamida.
 - (D) Ciclosporina.
 - (E) Cefalosporina.
44. Paciente deu entrada na emergência com rebaixamento do nível de consciência, hemiparesia moderada, rigidez precoce de descerebração e distúrbios vegetativos. Familiar informa que o mesmo vinha relatando há cerca de um mês cefaléia, náuseas com episódios de vômito e fotofobia. Após encaminhamento para a unidade de terapia intensiva e realização de exames, o paciente foi diagnosticado com hemorragia subaracnóidea por ruptura de aneurisma. Analise as afirmativas sobre os cuidados de enfermagem nesse caso, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Administrar anti-histamínico para minimizar o risco de hipertensão induzida por convulsão.
 - () Administrar solução salina hipotônica para reduzir os níveis de sódio, uma vez que é comum ocorrer hipernatremia.
 - () Monitorar a pressão intracraniana por meio de cateter ventricular avaliando a superdrenagem rápida necessária para reduzir o sangramento local.
- (A) V – V – V
 - (B) V – F – V
 - (C) F – V – V
 - (D) F – F – V
 - (E) F – F – F



45. Segundo Craven e Hirnle (2006) qualquer trauma para a pele, como uma ferida, cria risco para função cutânea alterada. Assim, em relação aos tipos de feridas e suas respectivas descrições por Craven e Hirnle (2006), associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

Tipo de ferida/descriptores

1. Punção
2. Laceração
3. Abrasão
4. Contusão

Descrição

- () Ferida fechada; sangramento nos tecidos subjacentes a partir de trauma fechado; equimose.
- () Ferida que envolve o atrito da pele; superficial; procedimento dermatológico para remoção do tecido cicatricial.
- () Trauma penetrante intencional ou acidental por instrumento pontiagudo que penetra na pele e no tecido subjacente.

- (A) 1 – 4 – 2
(B) 4 – 3 – 1
(C) 3 – 1 – 2
(D) 4 – 1 – 3
(E) 3 – 1 – 4

46. A prevalência de incontinência urinária aumenta com a idade e é maior entre mulheres do que entre os homens (FREITAS et al, 2011). Assinale a alternativa que indica causas de incontinência urinária transitória em pessoas idosas.

- (A) Delirium e hiperatividade do detrusor.
(B) Flacidez da musculatura pélvica e distúrbios psíquicos.
(C) Infecção urinária e uretrite.
(D) Hipoatividade do detrusor e deficiência esfinteriana intrínseca.
(E) Alteração da pressão uretral e bexiga hiperativa.

47. Sobre as recomendações de precauções imediatas e de seguimento do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) em casos de exposição e acidentes com material biológico por trabalhadores do campo da saúde, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Lavar exaustivamente a área atingida com água e sabão e comunicar imediatamente ao serviço médico da instituição.
- II. O serviço médico deve registrar o acidente de trabalho e emitir imediatamente a CAT, sendo sempre necessário o afastamento do funcionário.
- III. Solicitar ao acidentado concordância por escrito para a realização dos seguintes exames: anti-HIV, HbsAg, anti-HBC-IGM, anti-Hbs, anti-HCV.
- IV. Iniciar imediatamente o uso de quimioprofilaxia até 2 horas após o acidente, não devendo ser suspenso mesmo no caso dos exames realizados serem negativos.

- (A) Somente I e III estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.

48. Em relação ao hemocomponente que é a principal fonte de fibrinogênio concentrado, assinale a alternativa correta.

- (A) Concentrado de plaqueta.
(B) Concentrado de hemácia.
(C) Plaquetaférese.
(D) Crioprecipitado.
(E) Concentrado de granulócito.



49. Paciente com choque séptico secundário a infecção respiratória evolui com anasarca e hipovolemia. Com intuito de reduzir edema e aumentar o volume plasmático foi prescrito 500ml de solução salina hipertônica a 2%. A unidade dispõe de frascos de 500ml de solução fisiológica a 0,9% e ampolas de 10ml de NaCl a 20%. Assinale a alternativa correta que corresponde a quantidade de ml da solução de NaCl a 20% a ser adicionada no frasco de solução fisiológica a 0,9% para o preparo da solução prescrita.

- (A) 10ml
- (B) 15ml
- (C) 21ml
- (D) 25,5ml
- (E) 27,5ml

50. Paciente hospitalizado com insuficiência renal aguda e falência suprarrenal necessita de administrações de diárias de 1,25g de 6/6h de hidrocortisona. A unidade dispõe de ampolas de 5ml de hidrocortisona com 500mg/ml. Assinale a alternativa correta que corresponde a quantidade de ampolas a ser utilizada diariamente por este paciente.

- (A) 02
- (B) 04
- (C) 06
- (D) 08
- (E) 10

51. O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) consiste no atendimento emergencial, extra-hospitalar, realizado por profissionais especialmente treinados com o objetivo de identificar rapidamente as situações em que se envolvem as vítimas. É dividido em quatro etapas sequenciais:

- (A) Abordagem primária – Controle da cena – Abordagem secundária – Sinais Vitais e Escala de coma.
- (B) Controle da cena – Abordagem primária – Sinais Vitais e Escala de coma – Abordagem secundária.
- (C) Sinais Vitais e Escala de coma – Controle da cena – Abordagem primária – Abordagem secundária.
- (D) Controle da cena – Abordagem primária – Abordagem secundária – Sinais Vitais e Escala de coma.
- (E) Abordagem primária – Controle da cena – Sinais Vitais e Escala de coma – Abordagem secundária.

52. Analise as afirmativas sobre Hemoterapia, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Hemácias podem ser transfundidas em acesso venoso compartilhado, somente, com Soro Glicosado a 5%.
- () É contraindicado a transfusão em pacientes com febre em virtude da possibilidade de hemólise ou de outro tipo de reação transfusional.
- () Nenhuma transfusão deve exceder o período de infusão de 6 horas. Caso este período seja ultrapassado a transfusão deve ser interrompida e a unidade descartada.

- (A) V – V – V
- (B) V – F – V
- (C) F – V – V
- (D) F – F – V
- (E) F – F – F



53. Sobre o dimensionamento do pessoal de enfermagem, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Para efeito de cálculo, na assistência intensiva, devem ser consideradas 17,9 horas de Enfermagem, por cliente nas 24 horas.
- II. Para assistência mínima e intermediária, a distribuição percentual do total de profissionais de Enfermagem deve ser de 33 a 37% Enfermeiros (mínimo de seis) e os demais, Auxiliares e/ ou Técnicos de Enfermagem.
- III. No Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) é considerado Paciente de Cuidados Semi-Intensivos (PCSI) aquele que se apresenta clinicamente estável, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas.
- IV. Unidades de Saúde com mais de 50 leitos, destinadas a Cuidados Mínimos e Intermediários, localizados em regiões interioranas, em que, houver dificuldades de contratar enfermeiros, poderá ter a equipe complementada com Técnicos de Enfermagem, respeitando-se a presença física de dois enfermeiros por período de trabalho.

- (A) Somente I e II estão corretas.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente II e III estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.

54. Uma vez diagnosticados e resolvidos os possíveis problemas existentes quanto à permeabilidade de vias aéreas, à respiração e à circulação; é comum a inserção de sondas gástricas na fase de reanimação, com o objetivo de:

- (A) aliviar a retenção de urina.
(B) aumentar uma possível dilatação aguda do estômago.
(C) remover conteúdo gástrico reduzindo os riscos de aspiração.
(D) comprimir o estômago antes de realizar um lavado peritoneal diagnóstico.
(E) permitir o monitoramento do débito urinário como índice de perfusão tecidual.

55. Em relação a caracterização das infrações éticas e disciplinares previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| 1. Infrações Leves | () | Danos patrimoniais ou financeiros. |
| 2. Infrações Graves | () | Ofensa a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa. |
| 3. Infrações Gravíssimas | () | Debilidade temporária de membro. |
| | () | Difamar organizações da categoria ou instituições. |
| | () | Deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função. |

- (A) 3 – 2 – 1 – 1 – 2
(B) 3 – 2 – 3 – 1 – 2
(C) 2 – 1 – 2 – 3 – 1
(D) 1 – 1 – 2 – 2 – 3
(E) 2 – 1 – 2 – 1 – 3

56. Muitos compostos químicos ambientais podem produzir efeitos tóxicos em diferentes órgãos ou sistemas orgânicos. Substâncias como o tetracloreto de carbono, o tricloetileno, o clorofórmio e a aflatoxina podem causar infiltração gordurosa, câncer e necrose celular no:

- (A) Fígado.
(B) Rim.
(C) Pulmão.
(D) Coração.
(E) Sistema Nervoso.



57. Analise as afirmativas sobre Exame Físico, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Embora a sequência do exame físico dependa de alguns fatores como motivo da busca de cuidados de saúde pelo cliente, o exame completa respeita a sequência: pele – cabeça e pescoço – tórax e pulmões – mamas – sistema cardiovascular – abdome – reto – genitália – sistema neurológico – sistema musculoesquelético.
- () Na primeira técnica fundamental utilizada no exame físico, a Inspeção, deve ser observado: postura e estatura; movimentos corporais; nutrição; padrão de fala e sinais vitais.
- () Timpanismo, Hiper-ressonância, Ressonância, Submacicez e Macicez são os tipos de sons audíveis na técnica da percussão.
- (A) V – V – V
(B) V – F – V
(C) F – V – V
(D) F – F – V
(E) F – F – F

58. As ambulâncias de Suporte Básico são veículos destinados ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado e com possível necessidade de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino (BRASIL, 2006). Segundo a Política Nacional de Atenção às Urgências, do Ministério da Saúde, alguns dos materiais e equipamentos que este tipo de ambulância deve dispor são:

- (A) Conjunto aeromédico; Respirador mecânico; Cadeira de rodas dobrável; Suporte para soro.
- (B) Suporte para soro; Maca articulada e com rodas; Bomba de Infusão com bateria e equipo.
- (C) Monitor cardioversor; Prancha curta e longa; Suporte para soro; Oxigênio com régua tripla.
- (D) Suporte para soro; Cilindro de oxigênio portátil com válvula; Talas; Bandagens triangulares.
- (E) Caixa completa de pequena cirurgia; Suporte para soro; Equipos para drogas fotossensíveis.

59. Sobre o processo de Auditoria em Enfermagem, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Uma Auditoria de Estrutura pode ser utilizada para que seja estabelecido se as pressões sanguíneas foram verificadas, conforme rotina estabelecida.
- II. Auditoria de Processo é a auditoria que monitora a situação financeira, o serviço de enfermagem, os registros médicos e o ambiente. Nessa auditoria existe uma relação entre cuidado qualificado e estrutura adequada.
- III. Auditorias de resultados, processos e estrutura podem ocorrer retrospectivamente (após o cliente receber o serviço), simultaneamente (quando o cliente está sendo atendido) ou com vistas ao futuro (prospectivas).
- IV. As Auditorias de Resultado determinam quais os resultados que ocorreram como consequência de intervenções específicas de enfermagem em relação aos clientes, demonstrando a qualidade do atendimento oferecido.

- (A) Somente I e II estão corretas.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente II e III estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.

60. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Sobre o caso de emergências psiquiátricas, são considerados sintomas graves.

- I. Destrutividade persistente e/ou deliberada.
II. Desinibição social excessiva.
III. Delirium.
IV. Tentativa de suicídio.
V. Isolamento e retração importantes e persistentes.

- (A) Somente I, II, e III estão corretas.
(B) Somente I, III e IV estão corretas.
(C) Somente II, III, IV e V estão corretas.
(D) Somente I, II, IV e V estão corretas.
(E) Somente I, II, III e V estão corretas.



61. Sobre a esquizofrenia e seus aspectos psicossociais, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Não há sintomas patognomônicos ou específicos para a esquizofrenia. Ao contrário, a sintomatologia é bastante variável, e muda de acordo com o curso e tratamento medicamentoso.
- II. Familiares e amigos em geral não percebem mudanças no comportamento do paciente, nas suas atividades pessoais, contato social e desempenho no trabalho e/ou escola, visto ser um transtorno psiquiátrico silencioso.
- III. Os primeiros sinais e sintomas da doença aparecem mais comumente durante a infância. Apesar de poder surgir de forma abrupta, o quadro mais frequentemente se inicia maneira insidiosa.
- IV. Entre os sintomas característicos da fase aguda da doença se destacam delírios, alucinações, alterações formais do pensamento e do afeto, e distúrbios da atividade psicomotora.

- (A) Somente I e II estão corretas.
- (B) Somente I e IV estão corretas.
- (C) Somente II e III estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

62. Em relação à Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras drogas assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo.

“A _____ não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Aliás, quando se trata de cuidar de vidas humanas, temos que, necessariamente, lidar com as singularidades, com as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta esta diversidade”. (BRASIL, 2003, p.10)

- (A) redução de danos
- (B) reabilitação
- (C) abstinência
- (D) recuperação
- (E) reinserção social

63. Analise as afirmativas sobre Captação, Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Todos os potenciais doadores falecidos de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo deverão ser submetidos obrigatoriamente, antes da alocação dos enxertos, a realização de exames sorológicos para toxoplasmose, citomegalovírus e Epstein-Barr, devendo ser sua realização regulamentada pela respectiva CNCDO.
- () Serão critérios absolutos de exclusão de doador de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo humano: neoplasias (exceto tumores primários do Sistema Nervoso Central e carcinoma in situ de útero e pele).
- () A retirada de tecidos de doadores falecidos poderá ser realizada por médicos ou enfermeiros. Profissional de nível técnico poderá participar mediante comprovação de treinamento e sob supervisão do responsável técnico do banco para onde os tecidos serão transferidos.

- (A) V – V – V
- (B) V – F – V
- (C) F – V – V
- (D) F – F – V
- (E) F – F – F



64. Analise as afirmativas sobre as atribuições do enfermeiro nas ações da Atenção Básica/Saúde da Família em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.
- () Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa a serviços de referências de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais.
- () Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da equipe.

- (A) V – V – V
- (B) V – F – V
- (C) F – V – V
- (D) F – F – V
- (E) F – F – F

65. Segundo a Política Nacional de Atenção às Urgências, do Ministério da Saúde, alguns dos medicamentos obrigatórios que deverão constar nos veículos de suporte avançado são:

- (A) Epinefrina; Soro Glicosado 5%; Fiber Bran; Gentalax; Furosemida.
- (B) Lanatosideo C; Ketalar; Midazolam; Dimeticona; Laxol.
- (C) Soro fisiológico 0,9%; Adrenalina; Diazepam; Fentanil; Dipirona.
- (D) Soro fisiológico 0,9%; Dopamina; Anfepramona; Clomid; Laxol.
- (E) Soro Soro Glicosado 5%; Adrenalina; Diazepam; Finasterida; Gentalax.

66. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo.

“O termo _____ foi dado à terapêutica que utiliza os medicamentos cujos constituintes ativos são plantas ou derivados vegetais, e que tem a sua origem no conhecimento e no uso popular. As plantas utilizadas para esse fim são tradicionalmente denominadas medicinais”. (BRASIL, 2012, p. 13).

- (A) Ayurveda
- (B) Medicina Chinesa
- (C) Prática Integrativa
- (D) Fitoterapia
- (E) Terapia Alternativa

67. Na realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem, com base nos dados do histórico, as complicações potenciais que podem se desenvolver no paciente com Infarto do Miocárdio, incluem as seguintes:

- (A) Edema Agudo de Pulmão; Insuficiência Cardíaca; Choque Cardiogênico; Disritmias.
- (B) Paradas Cardíacas e Disritmias; Insuficiência Cardíaca; Anemia; Insuficiência hepática; Sepsis.
- (C) Edema Agudo de Pulmão; Impotência; Insuficiência Cardíaca; Insuficiência Renal Aguda;
- (D) Derrame pericárdico e tamponamento cardíaco; Insuficiência Cardíaca; Disfunção Renal.
- (E) Ruptura miocárdica; Insuficiência Cardíaca; Anemia; Ansiedade grave; Insuficiência hepática.



68. Sobre as Úlceras de Perna, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. As úlceras venosas são pequenas ulcerações circulares e profundas nas pontas dos dedos dos pés ou nos espaços interdigitais.
- II. As úlceras arteriais localizam-se geralmente na área do maléolo medial ou lateral (área da polaina) e são tipicamente grandes, superficiais e altamente exsudativas.
- III. O debridamento cirúrgico agudo é o método mais rápido e pode ser realizado por um médico ou enfermeira certificada em cuidados de feridas em colaboração com o médico e respeitando os princípios legais estipulados pelo Conselho da profissão.
- IV. No processo de Sistematização da Assistência de Enfermagem, as principais metas para o paciente que apresenta Úlcera de Perna, podem incluir: restauração da integridade da pele, mobilidade física adequada, nutrição adequada e ausência de complicações.

- (A) Somente I e II estão corretas.
- (B) Somente I e III estão corretas.
- (C) Somente II e III estão corretas.
- (D) Somente II e IV estão corretas.
- (E) Somente III e IV estão corretas.

69. A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde é destinada aos profissionais:

- (A) Médicos e Enfermeiros, somente.
- (B) Odontólogos e Fisioterapeutas, somente.
- (C) Técnicos de RX e Serviços Gerais, somente.
- (D) Serviços Gerais e Gestores, somente.
- (E) Trabalhadores de Serviços de Saúde.

70. Analise as afirmativas sobre o 5º Sinal Vital, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Os três fatores que devem ser considerados em um histórico completo da dor, são: a intensidade, a quantidade e a regulação atemporal.
- () Escala Análoga Visual, Escala de Dor de Faces, Escala Numérica de 0 a 10 de Intensidade da Dor e Escala Descritiva Simples de Intensidade da Dor, são as escalas mais utilizadas para medir a Intensidade da Dor.
- () A dor é uma experiência sensorial e emocional associada à lesão tissular real ou potencial. Considerada como 5º Sinal Vital, é importante que a(o) enfermeira(o) conheça o processo fisiopatológico da dor, as consequências fisiológicas e patológicas da dor e os métodos usados para seu tratamento.

- (A) V – V – V
- (B) V – F – V
- (C) F – V – V
- (D) F – F – V
- (E) F – F – F

FINAL DA PROVA