



EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO/2021
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2022

029. PROVA OBJETIVA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS

ESPECIALIDADE: OTORRINOLARINGOLOGIA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Um homem de 53 anos, ao atravessar a rua, é atingido por um ônibus. Socorrido, no hospital constata-se contusão cerebral e fratura exposta de perna direita. Os exames de imagem do cérebro não revelam alterações que requeiram intervenção cirúrgica; ele é submetido, então, a uma cirurgia ortopédica. No terceiro dia de internação, ainda confuso, evolui com febre e, em 3 dias, vai a óbito, com o diagnóstico de septicemia de origem pulmonar.

Assinale a alternativa que apresenta a causa básica do óbito a ser registrada na declaração de óbito.

- (A) Pedestre traumatizado em colisão com um ônibus.
- (B) Fratura exposta de perna direita.
- (C) Contusão cerebral.
- (D) Septicemia.
- (E) Pneumonia.

02. No Brasil, somente 25% das pessoas sexualmente ativas praticam sexo seguro usando preservativo em todas as relações sexuais. O menor percentual foi encontrado nas regiões Norte e Nordeste. Evidenciam-se, consistentemente, em todas as regiões, níveis menores de uso regular de preservativo entre as pessoas que não completaram o ensino fundamental.

Diante desse quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) O Ministério da Saúde deve realizar campanhas para incentivar o uso de preservativos ao mesmo tempo em que deve distribuir gratuitamente anticoncepcionais que evitem gravidez indejada.
- (B) As diferenças regionais encontram explicação na tradição das populações dos estados do Norte e Nordeste em incentivar a constituição de família com grande número de membros e daí a dificuldade em estimular o uso de preservativos.
- (C) As diferenças regionais devem ser levadas em conta na organização das redes de saúde e nas linhas de cuidado para a promoção da saúde, prevenção e proteção contra agravos e enfermidades e para a assistência, integradas a outras políticas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Embora haja diferenças regionais, de faixa etária e de escolaridade entre as pessoas que menos fazem uso de preservativos, é preciso se pensar em um material audiovisual que atingiria a todos com enfoque na necessidade de limitar o número de filhos em situação de precariedade social.
- (E) Sabendo que o medo de contrair doenças sexualmente transmissíveis é disseminado entre os adultos jovens, campanhas com imagens fortes de pacientes com AIDS e sífilis surtem efeitos positivos, independentemente das diferenças regionais e de escolaridade.

03. Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) começa a ser procurada por várias trabalhadoras de 15 a 17 anos com pequenas queimaduras nas coxas e nas mãos. Ao investigar as causas, verifica-se que elas trabalham em uma pequena empresa fabricante de bijuterias, e a atividade de trabalho consiste em montar as peças com o uso de solda quente.

Assinale a alternativa correta no tocante aos procedimentos adequados por parte da UBS.

- (A) Notificar os casos no SINAN somente se as trabalhadoras tiverem vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e comunicar à Pastoral do Menor.
- (B) Comunicar a vigilância em saúde para que entre em contato com a auditoria fiscal do trabalho com o objetivo de conseguir uma fiscalização o mais rápido possível e notificar os casos ao SINAN.
- (C) Encaminhar os casos ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional, pois somente esse órgão pode notificá-los ao SINAN.
- (D) Comunicar a auditoria fiscal do trabalho, único órgão com atribuição de realizar uma fiscalização em empresas que tenham menores de idade, e determinar a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).
- (E) Notificar os casos no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e articular-se com a vigilância em saúde com o objetivo de investigar as condições de trabalho, para mapear potenciais riscos e impactos à saúde das trabalhadoras.

04. No Brasil, a saúde da mulher

- (A) tem como diretriz o desenvolvimento de ações maternoinfantis como estratégia de proteção aos grupos de risco e em situação de vulnerabilidade.
- (B) no início da incorporação às políticas nacionais de saúde, limitava-se às demandas relativas à gravidez e ao parto.
- (C) foi incorporada às políticas nacionais de saúde em 1988, com o advento da Constituição Federal.
- (D) tinha como diretriz a execução de programas maternoinfantis, elaborados a partir da década de 1980.
- (E) após incorporada às políticas nacionais de saúde nos anos 1980, teve como resultado um forte impacto nos indicadores de saúde da população-alvo.

- 05.** Assinale a alternativa correta no tocante à vacina BCG.
- (A) Deve ser administrada em todos os recém-nascidos, independentemente do peso ao nascer.
 - (B) É contraindicada para crianças maiores de um ano.
 - (C) Deve ser administrada em criança não vacinada e portadora de HIV só após os 5 anos de idade.
 - (D) É indicada para crianças em qualquer idade e gestantes imunodeprimidas.
 - (E) Deve ser administrada em dose única o mais precocemente possível, de preferência logo após o nascimento.
- 06.** A Política Nacional de Humanização tem como uma das características
- (A) respeitar as diferentes especialidades e práticas de saúde para que discussões intersetoriais não interfiram na conduta de cada médico que goza de autonomia para suas decisões.
 - (B) estimular trabalhadores e usuários a buscarem o conhecimento da gestão dos serviços e da rede de saúde, sem, no entanto, interferir no processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.
 - (C) proporcionar aulas sobre aspectos clínicos das doenças, para que os usuários sejam capazes de auxiliar uns aos outros por meio de redes de contato.
 - (D) buscar transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas.
 - (E) estimular redes de contato, incluindo usuários e suas relações sociofamiliares nos processos de cuidado, restringindo as conversas em torno somente de questões estritas de aspectos clínicos das doenças.
- 07.** Bebê de 1 ano, com diarreia e vômitos há um dia, é levado pela mãe a uma UBS. Apresenta bom estado geral e não tem febre.
Assinale a alternativa correta.
- (A) A criança deve ser atendida na UBS, mesmo sem agendamento, e a mãe deve ser devidamente orientada quanto aos cuidados da criança.
 - (B) A mãe deve ser direcionada a um pronto-atendimento, pois trata-se de caso agudo.
 - (C) A criança deve ser agendada para um dia próximo, com a orientação de que, caso o quadro persista, deve procurar o pronto-atendimento.
 - (D) A mãe deve ser devidamente orientada quanto aos cuidados da criança e para retornar no dia seguinte no horário em que há atividade de acolhimento.
 - (E) A mãe deve ser devidamente esclarecida de que a UBS só atende casos agendados e orientada para manter a hidratação da criança.
- 08.** Assinale a alternativa que apresenta corretamente procedimentos no processo de rastreamento de hipertensão arterial crônica na Atenção Primária da Saúde (APS).
- (A) De acordo com a média dos dois valores pressóricos obtidos, a pressão arterial deverá ser novamente verificada a cada dois anos, se os valores forem menores que 120/80 mmHg, e a cada ano, se os valores forem maiores que 120/80 mmHg, independentemente da presença de outros fatores de risco para doença cardiovascular.
 - (B) Sabe-se que a pressão arterial medida por profissional médico tem maior fidedignidade do que a verificada pelos técnicos de enfermagem.
 - (C) Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando for à UBS para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada.
 - (D) Sempre que possível, a medida da pressão arterial deverá ser realizada no consultório médico para esclarecer o diagnóstico.
 - (E) A média de cinco aferições deve ser considerada como a pressão arterial (PA) do dia; se os valores observados diferirem em mais de 5 mmHg, a conduta correta é medir novamente.
- 09.** Muito tem se falado de imunidade coletiva. Assinale a alternativa correta sobre o tema.
- (A) Mesmo havendo suscetíveis, há um percentual de imunes suficiente para que a taxa de contágio de um determinado agente infeccioso seja desprezível.
 - (B) Para se atingir a imunidade coletiva a um determinado agente infeccioso, é preciso aceitar a ideia de que haverá um grande número de mortes pela doença.
 - (C) A imunidade coletiva a quaisquer agentes infecciosos é um conceito ultrapassado e deve ser abandonado pelos infectologistas.
 - (D) A imunidade coletiva a qualquer agente infeccioso é atingida com pelo menos 90% da população vacinada.
 - (E) A imunidade coletiva só pode ser atingida com vacina se o processo de vacinação for lento e gradativo.

10. Assinale a alternativa correta referente à quarentena.

- (A) A vacina dispensa a prática da quarentena, pois se pressupõe que ela bloqueia a transmissibilidade.
- (B) É a restrição de atividades das pessoas ou animais sãos que se expuseram a um caso de doença transmissível durante o período de transmissibilidade ou contágio, a fim de evitar a transmissão da doença durante o período de incubação, em caso de ter havido infecção.
- (C) É recomendada somente no caso de doenças de alta letalidade e cujo agente etiológico tem alta transmissibilidade e alta infectividade.
- (D) É o período em que o doente fica com restrição de atividades para se recuperar de uma doença infecciosa e para evitar disseminar o agente etiológico para outras pessoas.
- (E) É o período médio de distanciamento físico recomendado para uma doença infecciosa de alta transmissibilidade, que, em geral, é de 14 dias.

11. Uma técnica de enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com pacientes de covid-19 apresenta quadro compatível com *burnout* que um centro de referência em saúde do trabalhador relaciona ao trabalho que exerce, de cuidados intensivos a pacientes graves e ao excessivo número de plantões. É empregada sob o regime da CLT e afastada por ter sido considerada incapacitada temporariamente para o trabalho. Assinale a alternativa correta sobre o caso.

- (A) A emissão de CAT deve ser feita somente na certeza diagnóstica.
- (B) O caso deve ser notificado no SINAN, e o hospital deve emitir CAT caso seja comprovado que ela tem apenas um emprego.
- (C) O hospital deve emitir CAT somente se o afastamento for maior que 15 dias.
- (D) O *burnout* é considerado uma doença psíquica comum em cuidadoras, mas não em profissionais de saúde.
- (E) O caso deve ser notificado no SINAN, e o hospital deve emitir CAT.

12. Diversos autores da sociologia e da antropologia religiosas têm contribuído para a área da Antropologia da Saúde. Assinale a alternativa correta a respeito desse tema.

- (A) O elemento motivador para a religião dos milagres é a perspectiva de recompensa após a morte.
- (B) Todos os estratos sociais no Brasil têm formas semelhantes de dar significado a suas experiências e práticas.
- (C) O fenômeno da cura nas religiões populares está vinculado à expulsão pública do mal através de um ritual de luta.
- (D) A busca da cura por meios sobrenaturais ocorre em todas as classes sociais do Brasil.
- (E) Nas religiões, a doença é causada por espíritos obsessores que devem ser educados.

13. Pelo Código de Ética Médica, é vedado ao médico

- (A) deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
- (B) assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou, salvo se o paciente estiver sob seus cuidados habituais.
- (C) exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico do paciente, salvo nos casos em que os abusos por ele cometidos possam colocar a sua vida em risco.
- (D) intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação em processos terapêuticos de qualquer natureza.
- (E) deixar de realizar procedimentos que possam salvar uma pessoa em greve de fome, seja com hidratação, seja com alimentação compulsória.

14. Assinale a alternativa correta no tocante à influenza.

- (A) Os profissionais de saúde, incluídos nos grupos prioritários para vacinação contra *influenza*, devem ser vacinados a cada 3 anos no Brasil.
- (B) Todas as gestantes e puérperas com síndrome gripal, mesmo não complicadas, devem ser tratadas com antiviral.
- (C) O tratamento com antiviral de maneira precoce não reduz nem a duração dos sintomas nem a ocorrência de complicações da infecção pelo vírus *influenza*.
- (D) A suspensão de aulas e outras atividades é indicada para controle de surto de *influenza* como medida de prevenção e controle de infecção.
- (E) Gestantes e puérperas foram excluídas recentemente do grupo de pacientes com condições de fatores de risco para complicações por *influenza*.

- 15.** Assinale a alternativa que apresenta dados suficientes para se calcular a razão de mortalidade proporcional ou índice de Swaroop & Uemura.
- (A) Total de óbitos registrados no município durante o ano e a população do município ajustada para o meio do ano.
 - (B) Número de óbitos pelas doenças mais frequentes no município durante o ano e a população do município ajustada para o meio do ano.
 - (C) Número de óbitos de pessoas com 50 anos e mais anos de idade e número de óbitos totais no município.
 - (D) Número de óbitos por determinada doença ocorridos na população do município durante o ano e a população da área ajustada para o meio do ano.
 - (E) Número de nascidos vivos no município no ano e a população do município ajustada para o meio do ano.
- 16.** Segundo o Calendário de Vacinação no Brasil, em 2020, a vacina
- (A) pneumocócica conjugada está indicada para todas as crianças entre o nascimento até os 12 anos de idade.
 - (B) contra a febre amarela é indicada somente para pessoas com mais de 18 anos de idade.
 - (C) contra a hepatite B deve ser aplicada em duas doses, a primeira aos 12 meses idade e a segunda aos 2 anos de idade.
 - (D) contra o HPV (Papilomavírus humano) é contraindicada para pessoas imunodeprimidas.
 - (E) contra rotavírus deve ser realizada em duas doses, a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses.
- 17.** Assinale a alternativa correta sobre a clínica ampliada.
- (A) A prática da clínica ampliada é indicada principalmente aos casos em que os quadros clínicos são graves.
 - (B) Tem como pressuposto que um diagnóstico produz impactos diferentes de acordo com aspectos clínicos e sociais dos pacientes.
 - (C) Na clínica ampliada, o diagnóstico é o ponto de partida e o centro das ações de saúde.
 - (D) A clínica ampliada tem sido abandonada pela falta de resultados positivos.
 - (E) A prática da clínica ampliada tem como profissional principal o médico.
- 18.** Assinale a alternativa correta no tocante às populações de homens e mulheres no Brasil.
- (A) Há menor incidência de câncer de bexiga nos homens do que nas mulheres.
 - (B) Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, os homens praticam alimentação saudável em maior percentual em relação a mulheres.
 - (C) Pesquisas mostram que um percentual maior de mulheres do que de homens relata fazer uso e abuso de bebida alcoólica.
 - (D) Os homens, especialmente os jovens negros e pobres, são mais vulneráveis à violência do que as mulheres.
 - (E) Os homens têm expectativa de vida maior do que as mulheres.
- 19.** A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc) tem como um de seus eixos estratégicos
- (A) a atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido.
 - (B) a atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância que não incluem doenças crônicas, de baixa prevalência nesse segmento populacional.
 - (C) o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável a partir dos 2 meses de idade.
 - (D) a atenção à saúde de crianças com deficiência com a criação de centros especializados.
 - (E) a atenção à saúde mental, com a criação de rede de serviços especializados em crianças com problemas psíquicos.
- 20.** Os três principais agravos nutricionais das crianças brasileiras são:
- (A) compulsão alimentar, deficiência de vitamina D e vitamina A.
 - (B) anorexia nervosa, anemia e desnutrição.
 - (C) bulimia, deficiência de vitamina D e obesidade.
 - (D) anemia, obesidade e desnutrição.
 - (E) bulimia, anemia e ortorexia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em paciente com perda sensorineural unilateral à direita, o teste de

- (A) Schwabach estará prolongado à direita.
- (B) Rinne será negativo à direita.
- (C) Weber lateralizará para a esquerda.
- (D) Bing não pode ser realizado.
- (E) Bonnier lateralizará para a direita.


22. A manobra de deitar de lado (*side-lying maneuver*) avalia

- (A) apenas o canal semicircular anterior.
- (B) apenas o canal semicircular posterior.
- (C) os canais semicirculares lateral e posterior.
- (D) apenas o canal semicircular lateral.
- (E) os canais semicirculares anterior e posterior.

23. Na manobra de Dix-Hallpike, qual das situações é característica da cupulolitíase do canal posterior esquerdo?

- (A) Nistagmo vertical para baixo e torcional para a esquerda, com duração maior que um minuto.
- (B) Nistagmo vertical para cima e torcional para a esquerda, com duração maior que um minuto.
- (C) Nistagmo torcional para a direita, com duração maior que um minuto.
- (D) Nistagmo torcional para a esquerda, sem período de latência, com duração menor que um minuto.
- (E) Nistagmo horizontal ageotrópico com duração menor que um minuto.

24. Considere a seguinte timpanometria:



Essa timpanometria está relacionada a qual situação clínica?

- (A) Rinite alérgica.
- (B) Otite média crônica simples.
- (C) Otosclerose.
- (D) Fratura da bigorna.
- (E) Amigdalite caseosa.

25. O nervo facial origina-se

- (A) do segundo arco branquial.
- (B) da primeira fenda branquial.
- (C) do primeiro arco branquial.
- (D) da bolsa faríngea.
- (E) da segunda fenda branquial.

26. Paciente, 56 anos, diabético, apresenta otalgia moderada e otorreia à esquerda há 30 dias, sem melhora com tratamento com amoxicilina e azitromicina. À otoscopia, apresenta edema, hiperemia e tecido de granulação em porção inferior de meato acústico externo. Diante da principal hipótese diagnóstica, a conduta é

- (A) internação e introdução de gentamicina e metronidazol.
- (B) tratamento ambulatorial com fluconazol e antifúngico tópico.
- (C) cauterização química do tecido de granulação e ciprofloxacina tópica.
- (D) tratamento ambulatorial com amoxicilina com clavulanato de potássio e ciprofloxacina tópica.
- (E) internação e introdução de ceftazidima.

27. A síndrome de Usher é definida pela presença de

- (A) otite média, dor retro-orbitária e paralisia do nervo abducente.
- (B) língua plicada, paralisia facial recorrente e edema de lábio.
- (C) perda auditiva condutiva e heterocromia da íris.
- (D) perda auditiva sensorineural e retinopatia pigmentar.
- (E) perda auditiva sensorineural e bócio.

28. Qual das doenças causa perda auditiva sensorineural unilateral com mais frequência?

- (A) Rubéola.
- (B) Citomegalovirose.
- (C) Caxumba.
- (D) Sarampo.
- (E) Sífilis congênita.

29. Qual das seguintes situações clínicas é compatível com doença imunomediada da orelha interna?
- (A) Sexo feminino, 58 anos, diabética, com hipoacusia bilateral progressiva.
 - (B) Sexo masculino, 45 anos, hipertenso, com hipoacusia unilateral súbita.
 - (C) Sexo masculino, 68 anos, com hipoacusia unilateral progressiva.
 - (D) Sexo feminino, 30 anos, com hipoacusia bilateral flutuante ou progressiva.
 - (E) Sexo masculino, 25 anos, metalúrgico, com otorreia e hipoacusia unilateral.
30. Paciente refere zumbido pulsátil unilateral que melhora ou desaparece com a rotação da cabeça para o lado do zumbido. Qual é a principal hipótese diagnóstica?
- (A) Hipertensão intracraniana benigna.
 - (B) Hum venoso.
 - (C) Estenose da artéria vertebral.
 - (D) Lateralização do seio sigmoide.
 - (E) Estenose da artéria carótida.
31. O tratamento da vertigem posicional paroxística benigna do canal lateral é realizado com a manobra de
- (A) Gufoni.
 - (B) Semont.
 - (C) Yacovino.
 - (D) Epley modificada.
 - (E) Epley.
32. Qual das alternativas apresenta critério diagnóstico da paroxismia vestibular?
- (A) Mínimo de três crises de tontura externa por dia.
 - (B) Duração da crise de tontura menor que 1 minuto.
 - (C) Hipoacusia acompanhando o episódio de tontura.
 - (D) Ausência de zumbido.
 - (E) Resposta ao tratamento com fluoxetina.
33. Qual a duração das crises de vertigem da doença de Menière definida?
- (A) Entre 60 minutos e 12 horas.
 - (B) No mínimo 48 horas.
 - (C) No mínimo 72 horas.
 - (D) Entre 20 minutos e 24 horas.
 - (E) Entre 20 minutos e 12 horas.
34. Qual dos quadros clínicos é compatível com vertigem paroxística benigna da infância?
- (A) Sexo masculino, 4 anos, com otalgia e desequilíbrio com duração de 2 dias.
 - (B) Sexo feminino, 3 meses, com rotação da cabeça para um lado e do corpo para o lado oposto, com duração de horas, associada a náuseas e vômitos.
 - (C) Sexo feminino, 7 anos, vertigem e nistagmo, com duração de segundos, ao rolar na cama para a direita.
 - (D) Sexo feminino, 5 anos, com vertigem súbita, sem fator desencadeante, com duração de minutos a horas, e irmã com migrânea.
 - (E) Sexo masculino, 6 anos, com dificuldade para andar e desequilíbrio, progressivos, há 2 meses.
35. Durante realização de abertura do seio esfenoidal, observa-se sangramento intenso. Qual das artérias deve ter sido lesada?
- (A) Esfenoidal.
 - (B) Nasal lateral superior.
 - (C) Septal posterior.
 - (D) Septal superior.
 - (E) Nasal lateral posterior.
36. A resistência nasal aumenta
- (A) com a hiperventilação.
 - (B) com exercício físico.
 - (C) com a idade.
 - (D) com uso de mentol.
 - (E) com o aumento do PCO_2 .
37. Sobre o glioma, assinale a alternativa correta.
- (A) É uma lesão cerebral extracraniana com herniação da dura-máter.
 - (B) Não apresenta conexão com o sistema nervoso central.
 - (C) A forma extranasal é a mais comum.
 - (D) É diagnosticado tardiamente e pode malignizar.
 - (E) É um tumor não compressível e com presença do sinal de Fustenberg.
38. Os pacientes com rinite eosinofílica não alérgica apresentam
- (A) RAST positivo.
 - (B) eosinofilia nasal aumentada.
 - (C) teste de provocação nasal positivo.
 - (D) pouca resposta ao tratamento com corticoide tópico.
 - (E) IgE sérico total aumentado.

39. Qual das medicações causa rinite medicamentosa?
- (A) Sertralina.
 - (B) Losartana.
 - (C) Paroxetina.
 - (D) Enalapril.
 - (E) Hidroclorotiazida.
40. A área de Keystone é uma área de risco na realização das septoplastias. Quais estruturas anatômicas fazem parte dessa região?
- (A) Cartilagem lateral superior e lâmina perpendicular do etmoide.
 - (B) Cartilagem alar e quadrangular.
 - (C) Cartilagem alar inferior e espinha nasal anterior.
 - (D) Cartilagem alar superior e osso próprio nasal.
 - (E) Vômer e espinha nasal posterior.
41. Paciente apresenta rinossinusite crônica e lesão compatível com pseudomucocele em seios maxilares. A alteração genética responsável pela doença em questão está relacionada ao gene
- (A) AKT1.
 - (B) EGFR.
 - (C) KAT6B.
 - (D) TPCF.
 - (E) CFTR.
42. Em paciente com obstrução nasal unilateral, em báscula, com duração de 3 a 4 horas, mais perceptível em decúbito dorsal, sem alterações no exame físico otorrinolaringológico e nasofibroscópico, o médico deve
- (A) solicitar rinomanometria acústica.
 - (B) solicitar ressonância magnética de seios paranasais.
 - (C) orientar que esta situação é fisiológica.
 - (D) introduzir corticoide sistêmico.
 - (E) introduzir vasoconstritor tópico nasal.
43. São critérios para o diagnóstico da rinossinusite fúngica alérgica:
- (A) rinorreia amarelada e IgE sérica total aumentada.
 - (B) mucina alérgica e ausência de invasão de mucosa.
 - (C) IgE específica positiva para fungos e invasão de mucosa.
 - (D) cultura positiva para fungos e citológico nasal com eosinófilos.
 - (E) tomografia computadorizada com erosão óssea e IgE sérica total normal.
44. Paciente com leucemia mieloide aguda apresenta obstrução nasal, rinorreia clara e dor facial há 15 dias. Nega febre. A tomografia de seios paranasais demonstra ve-lamento de todos os seios paranasais e pequena área de erosão óssea em assoalho de seio maxilar direito. A conduta é
- (A) introdução de antibiótico e antifúngico por via endovenosa e, caso não haja melhora em 48 horas, indicação de cirurgia nasossinusal.
 - (B) introdução de antibiótico e corticoide por via endovenosa e corticoide tópico.
 - (C) introdução de antifúngico por via endovenosa e indicação de cirurgia nasossinusal.
 - (D) introdução de antibiótico por via oral, corticoide tópico e lavagem nasal com solução fisiológica.
 - (E) introdução de antibiótico e antifúngico por via oral e lavagem nasal com solução fisiológica.
45. Qual dos seguintes antibióticos é o mais indicado para o tratamento de rinossinusite em pacientes com fibrose cística?
- (A) Ciprofloxacina.
 - (B) Clindamicina.
 - (C) Gentamicina.
 - (D) Metronidazol.
 - (E) Amoxicilina com clavulanato de potássio.
46. Qual é o agente etiológico do rinoscleroma?
- (A) *Streptococcus*.
 - (B) *Pseudomonas*.
 - (C) *Staphylococcus*.
 - (D) *Klebsiella*.
 - (E) *Legionella*.
47. Segundo a classificação de Kuhn, a presença de mais de uma célula acima do *agger nasi*, mas abaixo do *frontal beak*, é classificada como tipo
- (A) I.
 - (B) IV.
 - (C) III.
 - (D) V.
 - (E) II.

- 48.** Sobre o distúrbio neuropsiquiátrico autoimune relacionado à infecção por estreptococos (sigla em inglês – PANDAS), assinale a alternativa correta.
- (A) É mais comum no sexo feminino.
 - (B) O paciente não apresenta história familiar pregressa.
 - (C) Tem início na idade pré-puberal.
 - (D) É um transtorno depressivo.
 - (E) A amigdalectomia é o tratamento preventivo de novas crises.
- 49.** A forma clínica mais comum do líquen plano é a
- (A) descamativa, muito sintomática.
 - (B) atrófica, muito sintomática.
 - (C) hipertrófica, pouco sintomática.
 - (D) reticular, pouco sintomática.
 - (E) erosiva, muito sintomática.
- 50.** O laudo do exame anatomopatológico de lesão de cavidade oral identificou fenda acantolítica suprabasal. Esse achado é característico
- (A) do pênfigo vulgar.
 - (B) do herpes zoster.
 - (C) da afta major.
 - (D) do penfigoide bolhoso.
 - (E) do líquen plano.
- 51.** Assinale a alternativa correta sobre a sialoadenose.
- (A) Abaulamento e dor em região parotídea são as queixas mais comuns.
 - (B) Tem relação com hipovitaminose A.
 - (C) Causa atrofia das glândulas parótida e submandibular.
 - (D) Pode evoluir para adenocarcinoma.
 - (E) O diagnóstico é feito com ultrassonografia das glândulas salivares.
- 52.** Na avaliação de paciente com disфонia devido a hipotireoidismo, pode-se encontrar
- (A) diminuição da frequência fundamental.
 - (B) aumento do tempo fonatório total.
 - (C) aumento do *loudness*.
 - (D) aumento da extensão vocal.
 - (E) diminuição do ataque vocal.
- 53.** Sobre o hemangioma subglótico, assinale a alternativa correta.
- (A) Tem pouca associação com hemangiomas cutâneos na região de cabeça e pescoço.
 - (B) Pode regredir até os 10 anos de idade.
 - (C) A droga de escolha para o tratamento é propranolol.
 - (D) O estridor é secundário à paralisia de prega vocal causada pelo tumor.
 - (E) É a neoplasia laríngea mais frequente dos lactentes e causa estridor unifásico.
- 54.** Criança, 4 anos, apresenta febre baixa, dor cervical e tosse rouca há 3 dias. A radiografia cervical mostra o “sinal da torre”. A principal hipótese diagnóstica é
- (A) laringite catarral.
 - (B) laringotraqueíte viral.
 - (C) epiglote aguda.
 - (D) crupe espasmódico.
 - (E) laringite estridulosa.
- 55.** O exame anatomopatológico de lesão em prega vocal traz a descrição de presença de microrganismo com aspecto de “roda de leme” na amostra. O tratamento dessa doença deve ser feito com
- (A) amoxicilina com clavulanato de potássio.
 - (B) esquema quádruplo.
 - (C) glucamina.
 - (D) itraconazol.
 - (E) dapsona.
- 56.** Os dois principais sintomas iniciais dos carcinomas de rinofaringe são
- (A) otalgia e otorreia.
 - (B) dor e epistaxe.
 - (C) obstrução nasal e ronco.
 - (D) adenopatia cervical e hipoacusia.
 - (E) disfagia e disфонia.
- 57.** O tumor de Warthin
- (A) ocorre entre os 15 e 20 anos de idade.
 - (B) causa paralisia facial periférica por invasão nervosa.
 - (C) tem evolução rápida e deve ser tratado com radioterapia.
 - (D) é mais comum em mulheres.
 - (E) ocorre na glândula parótida.

58. Em relação ao nódulo vocal, pode-se afirmar que

- (A) as características perceptivas auditivas são: voz rugosa, soprosa, tensa e estrangulada e, por vezes, com quebra de sonoridade.
- (B) o tratamento é clínico com fonoterapia e repouso vocal.
- (C) por se tratar de uma lesão superficial, não há comprometimento da onda mucosa à estroboscopia.
- (D) o tratamento cirúrgico está indicado no caso de profissionais da voz.
- (E) a fenda característica do nódulo vocal é a fusiforme.

59. Sobre a distonia laríngea, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento de escolha para a distonia de abdução é a injeção de toxina botulínica no músculo tireoaritenóideo.
- (B) Na distonia de adução, as tarefas vocais se apresentam melhor na realização de sons surdos e sons agudos.
- (C) Na distonia de abdução, a eletromiografia pode ser útil ao mostrar atividade elétrica no músculo cricoaritenóideo lateral durante a fonação.
- (D) O tratamento com tireoplastia do tipo I de Ishiki está indicado nas distonias de abdução.
- (E) O diagnóstico diferencial de distonia de abdução pode ser feito com disfonia psicogênica e tensão musculoesquelética.

60. Com relação à cirurgia nasal e à sua importância no tratamento da SAOS, pode-se afirmar que

- (A) não deve ser indicada em pacientes com SAOS grave.
- (B) pode piorar a adesão ao uso do CPAP.
- (C) leva à melhora significativa na redução do IAH.
- (D) não contribui para a adesão ao uso do aparelho intraoral.
- (E) contribui para a redução da sonolência diurna e dos roncos.

