



EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO/2023
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2024

015. PROVA OBJETIVA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS

ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Assinale a alternativa correta sobre o conteúdo da Portaria nº 1.823/2012.

- (A) Ela estrutura a Rede Nacional de Atenção Integral de Saúde do Trabalhador (RENAST) no contexto da Rede de Atenção à Saúde (RAS), dentre outras estratégias.
- (B) Uma das estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) é a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores utilizando exclusivamente base de dados secundários.
- (C) Uma das estratégias da PNSTT é a integração da Vigilância em Saúde do Trabalhador com a atenção especializada.
- (D) As ações em saúde do trabalhador e da trabalhadora nos serviços de urgência e emergência se restringem ao preenchimento do laudo e ao exame médico da Comunicação de Acidente do Trabalho.
- (E) O estímulo à participação da comunidade se dá por meio de convocação de todos os trabalhadores do mercado formal.

02. A equipe de saúde de uma UBS constata que Joelma está grávida em decorrência de uma situação de violência sexual. Assinale a alternativa correta.

- (A) Joelma deve ser encaminhada para o atendimento psicológico logo na primeira consulta, pois o procedimento é obrigatório.
- (B) Joelma deve ser informada quanto às possibilidades alternativas à interrupção da gravidez, como a assistência pré-natal e entrega da criança para adoção.
- (C) Como geralmente há trauma psicológico, detalhes sobre forma(s) de constrangimento utilizada(s) não devem ser solicitados.
- (D) Joelma deve ser imediatamente encaminhada para a interrupção da gravidez antes que o tempo para providências nesse sentido seja ultrapassado.
- (E) A experiência mostra que a interrupção da gravidez é seguida de arrependimento, de forma que a equipe de saúde deve tentar sensibilizar Joelma para outras opções.

03. Assinale a alternativa correta sobre a Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele, de ser informado sobre sua saúde e deve compartilhar sua dor e alegria com sua rede social como processo terapêutico.
- (B) Todas as informações da saúde entre gestores e trabalhadores da saúde, pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes áreas devem ser trocadas presencialmente.
- (C) Cogestão expressa a inclusão dos usuários nos processos de análise, decisão e responsabilidade iguais na gestão e divisão de tarefas administrativas de um serviço de saúde.
- (D) Acolhimento do usuário é identificar sua necessidade e peculiaridade e deve ser conduzida pelo profissional médico.
- (E) A cogestão é favorecida pelas rodas de conversa para colocar as diferenças em contato de modo a produzir movimentos de desestabilização que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de atenção.

04. Um jovem, vítima de um acidente de motocicleta, chega a um serviço de urgência com quadro de queda da pressão arterial, com hemoglobina baixa, dor à palpação de abdômen e distensão abdominal. É encaminhado para laparotomia e durante a cirurgia tem uma parada cardíaca. Verifica-se rompimento de fígado e baço. Assinale a alternativa correta quanto à causa básica a ser registrada na declaração de óbito.

- (A) Motociclista traumatizado em um acidente de transporte.
- (B) Hipovolemia.
- (C) Rompimento de vísceras.
- (D) Anemia aguda.
- (E) Parada cardiorrespiratória.

05. Assinale a alternativa correta sobre o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável.

- (A) Entre os 4 e 6 meses de idade, a criança deve receber complementarmente ao aleitamento materno, alimentos levemente adocicados, mais suaves ao paladar.
- (B) A promoção do aleitamento materno exclusivo para os bebês de baixo peso e/ou pré-termos deve ser feita somente quando há aceitação familiar dessa prática.
- (C) A prática do aleitamento materno depende basicamente das orientações corretas fornecidas às mães pela equipe de saúde da maternidade.
- (D) O aleitamento materno exclusivo é preconizado para todas as crianças até os 4 meses de idade, devendo ser complementado a partir dessa idade.
- (E) O aleitamento materno exclusivo deve ser praticado até os 6 meses e complementado com alimentos apropriados até os 2 anos ou mais.

- 06.** Assinale a alternativa correta sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM).
- (A) Os primeiros programas materno-infantis tinham suas metas definidas pelos níveis federal, estadual e municipal.
 - (B) No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde no século XIX, juntamente com a saúde das crianças.
 - (C) Segundo a PNAISM, gênero como elemento constitutivo das relações sociais entre homens e mulheres, é uma construção social e histórica.
 - (D) O câncer de útero só atinge mulheres heterossexuais, que são dispensadas de exames preventivos.
 - (E) A PNAISM considera que, para as mesmas patologias, as mulheres negras morrem na mesma faixa etária que mulheres e homens brancos, de um modo geral.
- 07.** Um jovem de 22 anos programa uma viagem para a região Amazônica e não se lembra se tomou a vacina contra a febre amarela. Assinale a alternativa correta.
- (A) Independentemente de qualquer coisa, o jovem deve receber um reforço da vacina, obrigatório a cada 10 anos.
 - (B) Em caso de não ter recebido a vacina contra a febre amarela até essa idade, não há mais indicação, pois ele deve ser imune por doença assintomática.
 - (C) O jovem deve receber uma dose da vacina cuja composição é de vírus inativado e um reforço a cada 5 anos.
 - (D) O jovem deve receber uma dose única da vacina, cuja composição é de vírus atenuado.
 - (E) Viagens para a região Amazônica não requerem cuidados especiais para febre amarela.
- 08.** Assinale a alternativa correta referente ao acesso aos serviços e às ações do SUS.
- (A) O acesso com equidade deve ser uma preocupação constante no acolhimento à demanda espontânea, entendendo-se equidade como um princípio de justiça, de que é preciso tratar diferentemente os desiguais.
 - (B) O respeito rigoroso da ordem de chegada no acolhimento à demanda espontânea tem se mostrado o melhor critério para obedecer ao princípio de justiça e equidade.
 - (C) Mesmo em situações não previstas, como um dia em que a quantidade de atendimentos está abaixo do esperado, a demanda espontânea deve ser agendada para atendimento posterior, o que faz parte da educação sanitária.
 - (D) Pode-se afirmar que atualmente não há práticas que resultam em restrição do acesso da população no SUS, como filas para o atendimento e distribuição de senhas.
 - (E) O atendimento das urgências em uma UBS é muito semelhante ao atendimento em unidades de pronto-socorro ou pronto atendimento em todos os aspectos.
- 09.** Assinale a alternativa que contenha agravos relacionados predominantemente à população masculina.
- (A) Tentativas de suicídio e doenças pulmonares obstrutivas crônicas.
 - (B) Suicídios e mortes por causas externas.
 - (C) Tabagismo e *burnout*.
 - (D) Violência sexual e homicídios.
 - (E) Episódios depressivos e tuberculose.
- 10.** Assinale a alternativa correta sobre o sarampo.
- (A) É de notificação imediata, e a imunidade passiva conferida por anticorpos transmitidos pela via transplacentária tem duração de 10 anos.
 - (B) É de notificação imediata, e recomenda-se a administração da vitamina A em todas as crianças acometidas pela doença, para reduzir a ocorrência de casos graves e fatais, no mesmo dia do diagnóstico do sarampo.
 - (C) É de notificação semanal, e o período de transmissibilidade é de mais de duas semanas.
 - (D) É de notificação imediata, e o tratamento conta com um medicamento específico para a doença, que deve ser administrado via endovenosa.
 - (E) É de notificação semanal, e o período de incubação costuma ser muito curto, de um dia.
- 11.** Assinale a alternativa correta sobre a influenza sazonal.
- (A) Os vírus tipo A, B, e C sofrem igualmente grandes variações antigênicas e merecem a atenção do Ministério da Saúde para que não haja risco de ocorrência de epidemias por extensos territórios.
 - (B) Dentre outros, tem indicação de tratamento imediato com fosfato de oseltamivir (Tamiflu) somente grávidas com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto.
 - (C) Os principais reservatórios do vírus influenza são, além do homem, os animais domésticos, como cães e gatos.
 - (D) Os antivirais apresentam de 70 a 90% de eficácia na prevenção da influenza e constituem ferramenta adjuvante da vacinação, mas a quimioprofilaxia indiscriminada não é recomendável, pois pode promover resistência viral.
 - (E) A transmissão do vírus entre as pessoas ocorre principalmente de modo indireto por meio de secreções e do ar.

12. Assinale a alternativa correta sobre doenças diarreicas agudas (DDA).
- (A) Os quadros clínicos são autolimitados e, portanto, não oferecem riscos significativos à vida dos acometidos.
 - (B) Os surtos de DDA deixaram de ser de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
 - (C) O rotavírus grupo B, um dos vírus envolvidos, atinge adultos e crianças, e a sua transmissão se dá por via fecal-oral, pela água e de pessoa a pessoa.
 - (D) A hidratação dos pacientes com DDA deve se dar preferencialmente por via oral.
 - (E) Os exames parasitológicos, cultura de bactérias e pesquisa de vírus em amostras de fezes ajudam pouco na elucidação dos agentes etiológicos.
13. Jamil tem 46 anos, está com excesso de peso há 10 anos e trabalha como motorista de ônibus há 15 anos. Não pratica nenhuma atividade física. Seu pai tinha diabetes do tipo 2 e morreu após sofrer um infarto aos 65 anos. Sente-se cansado nos últimos meses, mas não apresenta outros sintomas. Assinale a alternativa correta.
- (A) Jamil deve ser orientado para fazer uma dieta hipocalórica rigorosa para perder peso e, como não tem sintomas de diabetes, ficar sob observação.
 - (B) O rastreamento ao qual Jamil deve ser submetido é feito necessariamente por médico endocrinologista do ambulatório de especialidades.
 - (C) Jamil deve ser observado e se apresentar polidipsia e poliúria deve ser investigado para ver se tem diabetes na UBS.
 - (D) Jamil deve ser submetido a um check-up completo para prevenção de doenças crônico-degenerativas em geral.
 - (E) Jamil tem fatores de risco para diabetes do tipo 2 e deve ser encaminhado para consulta na UBS e rastreamento da doença.
14. Um jovem de 23 anos chega ao serviço de urgência de uma grande cidade sem vida. Apresenta ferimentos em várias partes do corpo, e os amigos que o levaram relatam que ele foi atropelado por um carro. Assinale a alternativa correta.
- (A) O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal.
 - (B) O médico do paciente deve ser solicitado a preencher a declaração de óbito.
 - (C) O médico do serviço de urgência deve preencher a declaração de óbito.
 - (D) Qualquer médico pode preencher a declaração de óbito.
 - (E) O corpo deve ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito.
15. A chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), da família *Togaviridae* e do gênero Alphavirus. Assinale a alternativa correta sobre a doença.
- (A) No Brasil, a transmissão autóctone foi confirmada no início do século XX.
 - (B) Não há relatos de casos de transmissão vertical.
 - (C) Não há descrição de casos crônicos.
 - (D) A transmissão se dá através da picada de fêmeas dos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* infectadas pelo CHIKV.
 - (E) A chikungunya tem caráter epidêmico com baixa taxa de morbidade.
16. Assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos diretos da estratificação de risco e a avaliação de vulnerabilidades.
- (A) Aumentar a produtividade de uma unidade de saúde.
 - (B) Comprovar a importância de uma UBS.
 - (C) Abreviar o tempo de sofrimento de uma pessoa.
 - (D) Comprovar a importância do profissional de saúde não médico.
 - (E) Otimizar o tempo de atendimento de cada profissional de saúde.
17. Assinale a alternativa correta sobre a hipertensão arterial sistêmica (HAS).
- (A) O incentivo a mudanças no estilo de vida vem sendo abandonado pela alta resistência dos pacientes.
 - (B) Apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce.
 - (C) Cada vez mais tem se constatado que o controle da doença deve ser feito em ambulatório especializado.
 - (D) A aferição da pressão arterial deve ser feita sempre pelo profissional médico.
 - (E) O diagnóstico nem sempre é fácil, e o controle requer medicamentos de alto custo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

18. Assinale a alternativa correta sobre a atenção integral à saúde de crianças e adolescentes.

- (A) Na definição das linhas de ação para o atendimento da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente destaca as políticas e os programas de assistência e previdência social.
- (B) Apesar da Constituição Brasileira de 1988 ter como um de seus princípios norteadores a prevalência dos Direitos Humanos, o cumprimento das obrigações internacionais assumidas é facultativo.
- (C) Os benefícios assistenciais e políticas compensatórias ou inclusivas como estratégias para redução dos riscos e agravos de saúde dos jovens têm se mostrado ineficazes.
- (D) Os adolescentes em conflito com a lei, que cumprem medidas socioeducativas, têm os mesmos direitos que os demais, cabendo às suas famílias a garantia de que sejam realmente efetivados.
- (E) As crianças e os adolescentes têm direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a identidade, autonomia, valores e ideias, o direito de opinião e expressão, de buscar refúgio, auxílio e orientação.

19. Assinale a alternativa correta sobre a andropausa.

- (A) Trata-se da diminuição gradual dos níveis sanguíneos da testosterona, que acompanha o envelhecimento e pode estar associada à diminuição da libido.
- (B) Os sintomas clínicos típicos da andropausa são: alterações de humor, com depressão e irritabilidade; distúrbios do sono; aumento da massa magra, volume e força muscular.
- (C) A andropausa está frequentemente associada ao aumento do antígeno prostático específico.
- (D) A ginecomastia ocorre em quase todos os homens na fase na andropausa.
- (E) A andropausa ocorre de forma súbita e atinge aproximadamente 25% dos homens após os 50 anos.

20. Cinco pessoas são atendidas em uma unidade de urgência: um rapaz de 20 anos, vítima de acidente de motocicleta quando entregava uma pizza, sofre uma fratura de braço; uma moça de 23 anos que ia de carona com o rapaz, tem fratura de perna; um senhor de 70 anos, atropelado quando saía de um restaurante com sua esposa; um policial com fratura de tornozelo ao cair em um buraco na rua, quando voltava para casa após um dia de trabalho e um pedreiro com carteira assinada, com fratura de tíbia, decorrente de uma queda de altura, quando trabalhava. Assinale a alternativa correta quanto à notificação compulsória no SINAN.

- (A) Apenas o pedreiro e o policial devem ser notificados como acidente de trabalho.
- (B) Apenas o motociclista entregador de pizza deve ser notificado como acidente de trabalho.
- (C) O motociclista entregador de pizza, o pedreiro e o policial devem ser notificados como acidentes de trabalho.
- (D) Apenas o pedreiro deve ser notificado como acidente de trabalho.
- (E) Nenhum dos casos deve ser notificado.

21. Atualmente temos uma grande variedade de métodos efetivos para controle da fertilidade. Os mais efetivos são considerados métodos de primeira linha, com taxa de gravidez menor que 2 por 100 mulheres-ano. Qual dos seguintes métodos é considerado como de primeira linha?

- (A) Adesivo.
- (B) Lactação.
- (C) Pílula.
- (D) Implante.
- (E) Preservativo feminino.

22. Na avaliação e/ou conduta de pacientes com sangramento uterino anormal, considera-se que

- (A) nos casos com sangramento agudo intenso e hemoglobina 8,5, deve-se hospitalizar a paciente e realizar a transfusão.
- (B) a biópsia endometrial é impositiva.
- (C) a histeroscopia é o método mais acurado no diagnóstico da hiperplasia endometrial.
- (D) a ultrassonografia tridimensional é o método diagnóstico de primeira linha.
- (E) na pós-menopausa, considera-se normal a medida de 4 mm de espessura endometrial pela ultrassonografia transvaginal.

23. Dentre as causas de algia pélvica e infertilidade, a endometriose tem grande papel sendo uma doença hormônio-dependente e definida pela presença de glândulas e estroma endometriais fora do sítio normal. Sobre o diagnóstico e conduta adequados, é correto afirmar que

- (A) os progestógenos são indicados, pois reduzem a densidade de fibras nas lesões endometrióticas, melhorando a sintomatologia e tamanho das lesões.
- (B) o marcador sérico CA-125 apresenta boa sensibilidade para a endometriose leve.
- (C) a laparoscopia deve ser indicada em todos os casos suspeitos com sintomas dolorosos.
- (D) os anti-inflamatórios não hormonais são a primeira linha de tratamento nas mulheres com dor intensa e infertilidade nas mulheres com endometrioma.
- (E) a ultrassonografia transvaginal tem boa sensibilidade para endometrioma e lesão retovaginal.

24. Quanto às causas e/ou tratamento das vulvovaginites, é correto afirmar que
- (A) na vaginose bacteriana os critérios de Amsel demonstram pH vaginal maior que 5,5, teste das aminas positivo e presença de *clue cells*.
 - (B) o tratamento do líquen escleroso vulvar deve ser feito com corticoides de baixa potência.
 - (C) na candidíase recorrente, o tratamento preconizado deverá ser com fluconazol via oral e tópica uma vez por semana por 6 meses.
 - (D) na infância as vulvovaginites são geralmente inespecíficas, sendo causadas por bactérias saprófitas, tais como *Streptococcus sp* e *Staphylococcus aureus*.
 - (E) na vaginose citolítica, o uso de *Lactobacillus* tem apresentado bons resultados.
25. O Ministério da Saúde Brasileiro e a Organização das Nações Unidas sugerem o diagnóstico e o tratamento sintomático das úlceras genitais. A FEBRASGO, mesmo nos casos em que há necessidade de tratamento sintomático, recomenda realizar as pesquisas de possíveis agentes etiológicos da seguinte forma:
- (A) coletar amostra de sangue para a sorologia de sífilis, hepatite B e C é suficiente.
 - (B) realizar biópsia de todas as úlceras com evolução maior que 30 dias com xylocaína a 2%.
 - (C) comprimir uma lâmina de vidro sobre úlcera e fixar, identificando as células multinucleadas de *Haemophilus ducrey*.
 - (D) coletar a linfa diretamente e adicionar bicarbonato na investigação do *Treponema pallidum* em microscopia de campo escuro.
 - (E) raspar superficialmente com espátula de Ayre e observar o Herpes simples à microscopia direta.
26. Paciente de 18 anos vem ao pronto atendimento com dor pélvica leve a moderada há 15 dias. Fazia uso de implante subdérmico e tinha relações sexuais com único parceiro, sem uso de *condom*. Ao exame físico, estava em bom estado geral, corada, afebril e eupneica. À palpação abdominal, dor em região pélvica bilateral e descompressão brusca negativa. Ao exame especular apresentava leucorreia amarelada em fundo de saco e colo uterino de coloração rósea habitual. Ao toque, havia dor à mobilização da cérvix. O diagnóstico mais provável e seu tratamento são respectivamente:
- (A) Apendicite – laparoscopia.
 - (B) Tricomoníase – metronidazol.
 - (C) ITU – levofloxacino.
 - (D) Gravidez ectópica – laparoscopia.
 - (E) Salpingite – doxiciclina e ceftriaxona
27. A conduta correta mediante alterações da colpocitologia oncótica do colo uterino nas lesões HPV induzidas é:
- (A) ASCUS – colposcopia.
 - (B) HSIL – imiquimode.
 - (C) LSIL – citologia semestral.
 - (D) HSIL – conização.
 - (E) LSIL – vacina HPV quadrivalente.
28. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico da SOP (síndrome dos ovários policísticos), de acordo com o Consenso de Rotterdam.
- (A) Hiperandrogenismo clínico e laboratorial, disfunção ovulatória e imagens de ovários policísticos ao ultrassom são obrigatórios para o diagnóstico.
 - (B) Na adolescência são necessários 3 critérios.
 - (C) A ultrassonografia pélvica apresenta ovários com volume acima de 8 cm cúbicos, com mais de 20 microcistos na periferia dos ovários e hiperecogenicidade central.
 - (D) Já existem 6 fenótipos descritos para as pacientes com SOP.
 - (E) Exames laboratoriais indicados para o diagnóstico são glicemia, insulina, TSH e SDHEA.
29. A disfunção sexual é definida como deficiência ou ausência persistente ou recorrente de fantasias /desejo por pelo menos 6 meses levando a sofrimento da pessoa acometida. Assinale a alternativa correta quanto ao tratamento dessa condição.
- (A) A terapia hormonal com tibolona pode aumentar o desejo sexual nas mulheres na pós-menopausa.
 - (B) O uso de estrogênio e progesterona pode levar a ressecamento vulvovaginal, dispareunia e redução do desejo sexual.
 - (C) A bupropiona pode reduzir a dopamina e aumentar o desejo sexual.
 - (D) Os inibidores seletivos da recaptção da serotonina estão indicados para estímulo ao desejo sexual feminino.
 - (E) A flibanserina está indicada no tratamento da anorgasmia.

- 30.** Paciente de 62 anos apresenta aumento da frequência urinária, urgeincontinência e noctúria. Exame ginecológico sem alterações. Frente a esse quadro, é correto afirmar que
- (A) o estímulo do sistema nervoso parassimpático inibe a micção.
 - (B) o quadro é de incontinência urinária de esforço e impõe-se solicitar o teste urodinâmico.
 - (C) se diagnostica a hiperatividade do detrusor e a terapêutica de primeira linha com tolterodina deve ser iniciada.
 - (D) a queixa é típica da infecção do trato urinário e prescreve-se fosfomicina em dose única.
 - (E) a bexiga hiperativa pode ser caracterizada e indica-se inicialmente fisioterapia do assoalho pélvico.
- 31.** Assinale a alternativa correta quanto à anatomia das mamas e dos órgãos genitais femininos.
- (A) As mamas são glândulas provenientes de tecido endodérmico, e sua drenagem linfática é feita por meio de 10 linfonodos na região axilar.
 - (B) O arco púbico tem em média 60 graus na mulher adulta.
 - (C) Os principais ligamentos pélvicos unem os ossos do quadril ao sacro e cóccix e são o obturador interno e tuberoso.
 - (D) Os músculos do assoalho pélvico são os elevadores do ânus, coccígeo e isquiococcígeo.
 - (E) A artéria vaginal é ramo da artéria ilíaca externa.
- 32.** Paciente de 49 anos com queixa de fogachos, insônia, diminuição do desejo sexual, irregularidade menstrual e fadiga. Ao exame físico geral, não apresenta alterações. Ao exame físico ginecológico, apresenta-se com diminuição do trofismo da mucosa vaginal e colo uterino.
- Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico e a conduta dessa paciente.
- (A) Fadiga crônica – realizar avaliação com nutrólogo.
 - (B) Climatério – terapia combinada estroprogestativa.
 - (C) Climatério – solicitar FSH e TSH para diagnóstico diferencial.
 - (D) Menopausa – terapia estrogênica e androgênica.
 - (E) Hipotireoidismo – hormônio tireoidiano.
- 33.** Qual dos fatores de risco familiares ou comportamentais apresenta os maiores riscos relativos para o câncer de mama?
- (A) Mutação patogênica conhecida.
 - (B) Uso de terapia hormonal na pós-menopausa.
 - (C) Câncer de mama ou ovário em um parente de 2º grau.
 - (D) Câncer de mama ou ovário (2 parentes de 1º grau > 50 anos).
 - (E) Obesidade na pós-menopausa.
- 34.** Assinale a alternativa correta com relação à conduta das lesões pré-malignas do colo uterino, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde – Instituto Nacional do Câncer em 2016.
- (A) Citologia com lesão intraepitelial escamosa de baixo grau: colposcopia imediata.
 - (B) Histologia de NIC 1 em biópsia: eletrocauterização.
 - (C) Esfregaço cérvico-vaginal representativo e normal: repetir a citologia em 3 anos.
 - (D) NIC 2/NIC 3 em biópsia: histerectomia.
 - (E) Lesão intraepitelial escamosa de alto grau: lesão totalmente visível à colposcopia com anátomo NIC 2, indica-se a exérese da zona de transformação.
- 35.** Paciente de 25 anos dá entrada no pronto atendimento relatando ser vítima de violência sexual (estupro). Como proceder neste atendimento?
- (A) Iniciar a profilaxia das ISTs no domicílio.
 - (B) É fundamental que o atendimento hospitalar seja feito dentro da primeira semana.
 - (C) Em caso de gestação, deve-se esclarecer sobre a possibilidade de interromper ou manter a gestação até o termo, de permanecer com a criança ou entregá-la para adoção.
 - (D) Encaminhar para procedimento policial e boletim de ocorrência inicialmente.
 - (E) A recusa do médico para este tipo de atendimento não caracteriza infração ética e legal, tais como imperícia e omissão de socorro.
- 36.** Segundo a classificação dos miomas uterinos (FIGO 2011), é correto afirmar que
- (A) os tipos 2 e 3 são submucosos com componente intramural, maior e menor que 50% respectivamente.
 - (B) os miomas de tipo 4 são intramurais.
 - (C) os miomas submucosos e pediculados são chamados de tipo 1.
 - (D) os miomas de tipo 5 são subserosos com menos de 50% de componente intramural.
 - (E) os miomas do tipo 7 incluem lesões cervicais.

37. Assinale a alternativa correta quanto às neoplasias malignas ovarianas.
- (A) Os carcinomas serosos bem diferenciados costumam ter progressão rápida.
 - (B) Os cânceres ovarianos tipo II não apresentam mutações do TP53 e têm evolução mais insidiosa.
 - (C) A utilização de marcadores associados a métodos de imagem mostrou-se eficaz no rastreamento.
 - (D) Os tumores epiteliais são mais frequentes que os de células germinativas.
 - (E) Os carcinomas mucinosos são os mais frequentes (30 a 70% dos casos).
38. Assinale a alternativa correta sobre a foliculogênese e esteroidogênese.
- (A) A cada ciclo cerca de 100 folículos são recrutados.
 - (B) A enzima aromatase transforma o estradiol em testosterona nas células da granulosa.
 - (C) Uma vez ativado e recrutado o folículo, as células da teca sofrem transformação, tornando-se cuboides.
 - (D) As células da granulosa proliferam-se e produzem androgênios pelo estímulo do LH.
 - (E) A conversão de pregnenolona em DHEA depende da enzima CYP17.
39. Adolescente do sexo feminino, 14 anos, vem para consulta ginecológica sem a presença dos pais e deseja método contraceptivo. Qual deverá ser a atitude do médico?
- (A) Realizar o atendimento e auxiliar na escolha do método contraceptivo.
 - (B) Solicitar o reagendamento da consulta com acompanhante responsável.
 - (C) Se já teve relação sexual, realizar a coleta da citologia oncológica.
 - (D) Desencorajar o início precoce da vida sexual.
 - (E) Ligar para os pais para autorização.
40. Adolescente de 14 anos, trazida pela mãe à consulta ginecológica, pois ainda não ocorreu sua primeira menstruação. Ao exame físico geral e especial, não houve alterações e ao exame ginecológico observou-se pilificação adequada e trofismo normal dos órgãos genitais externos femininos. A suspeita diagnóstica e a conduta adequada são:
- (A) Hiperplasia congênita de supra renal – solicitar 17 oh progesterona.
 - (B) Tumor adrenal – solicitar 17 oh progesterona.
 - (C) Síndrome de Morris – solicitar ultrassonografia pélvica e o cariótipo (46XX).
 - (D) Síndrome de Turner – solicitar cariótipo (45X0).
 - (E) SOP – dosar FSH, TSH e testosterona.
41. Paciente secundigesta de 35 anos, com história de natimorto anterior, no início de um novo pré-natal com 8 semanas de gestação. Os exames físicos geral e especial são normais e a pressão arterial é igual a 100 x 65 mmHg. Apresenta os seguintes resultados laboratoriais:
- Toxoplasmose IgG positivo, IgM positivo, teste de avidéz IgG alto.
- Glicemia de jejum 95 mg/dL.
- Outras sorologias negativas.
- Tipagem A negativo.
- Hemograma Hemoglobina 11g/dl / Hematócrito 35%
- A conduta mais adequada é:
- (A) realizar Rhogan 1 dose.
 - (B) iniciar tratamento com ferro.
 - (C) orientar para cesariana eletiva no termo.
 - (D) introduzir dieta para diabetes.
 - (E) iniciar tratamento para toxoplasmose.
42. Primigesta, 34 semanas de idade gestacional. Ao exame físico: AU = 30 cm, BCF rítmico, DU ausente e colo 1,0 cm ao toque vaginal. À ultrassonografia obstétrica a apresentação é pélvica, o peso fetal no percentil 7 (Hadlock), a placenta é fúndica e o índice de líquido amniótico (ILA) é 80 mm. Doppler de artéria umbilical e cerebral média normais. Como conduzir?
- (A) Retornos quinzenais – parto via obstétrica com 36 semanas.
 - (B) Perfil biofísico fetal quinzenal – parto via obstétrica com 40 semanas.
 - (C) Retorno ao pré-natal de risco habitual – versão externa com 38 semanas.
 - (D) Internação e controle diário da vitalidade fetal – parto cesariana com 37 semanas.
 - (E) Corticoterapia semanal até 36 semanas – parto via obstétrica com 37 semanas.
43. Assinale a alternativa correta quanto ao mecanismo de parto.
- (A) Na cefálica defletida de 1º grau, a cabeça se desprende da deflexão seguida da flexão.
 - (B) Nas defletidas de 3º grau 60% serão mento posteriores, 15% mento transversas e 25% mento anteriores.
 - (C) Na cefálica defletida de 3º grau o parto pode ser conduzido pela via vaginal nas mento anteriores.
 - (D) O parto vaginal pélvico em primíparas fica facilitado com ampla e precoce episiotomia.
 - (E) Em apresentações córmicas com dorso anterior, faz-se a versão interna por meio do pé superior.

44. Primigesta, interna na fase ativa de trabalho de parto, pré-natal sem intercorrências. Na assistência desse trabalho de parto, é importante:
- (A) Manter monitorização contínua da frequência cardíaca fetal no período expulsivo.
 - (B) Administrar fluidos intravenosos no primeiro período.
 - (C) Preferir a episiotomia médio lateral a perineotomia.
 - (D) Aspirar a orofaringe e nasofaringe se presença de líquido meconial.
 - (E) Clampar precocemente o cordão umbilical.
45. A cesariana deve ser indicada na presença de
- (A) oligoâmnio grave.
 - (B) apresentação pélvica.
 - (C) gestação múltipla.
 - (D) anel de Bandl.
 - (E) mecônio.
46. Puérpera, em consulta de 40 dias pós parto normal queixando-se de insônia e fadiga extrema, sem apetite para se alimentar adequadamente, e com dificuldade para perder o peso ganho durante a gestação. Refere ter ataques de pânico e dificuldades para cuidar de seu recém-nascido. Como proceder?
- (A) Diagnóstico de blues; orientar clonazepam para insônia.
 - (B) Quadro normal de evolução do puerpério; orientação da paciente.
 - (C) Aplicar escala de Edimburgo; se pontuar 10, indicar psicoterapia.
 - (D) Iniciar tratamento com polivitamínicos tais como ômega 3, vitamina D e DHA.
 - (E) Tratamento com psicoterapia e inibidores da recaptação de serotonina.
47. Ao se realizar cesariana em paciente com placenta prévia centro total e acretismo placentário, orienta-se a histerotomia fugidia e
- (A) solicitar ultrassonografia, observando se há espaços hipoeoicos na espessura da placenta e adelgaçamento do miométrio.
 - (B) manter a placenta *in loco* utilizando metotrexato posteriormente.
 - (C) em não ocorrendo dequitação espontânea, realizar histerectomia com balões nas artérias ilíacas internas.
 - (D) realizar a tentativa de extração manual da placenta.
 - (E) a extração fetal pelo segmento inferior.
48. O cuidado pré-natal foi concebido no início do século XX com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade materna, assim como perinatal. Assinale a alternativa correta sobre a eficácia do cuidado.
- (A) Prescrever progesterona vaginal nas gestantes de risco para parto prematuro.
 - (B) Solicitar culturas vaginais e retais para estreptococos do grupo B no primeiro trimestre.
 - (C) Tratar as gestantes com urocultura positiva se apresentar sintomatologia.
 - (D) Rastreamento do diabetes com glicemia de jejum tem maior eficácia que curva glicêmica.
 - (E) Não há necessidade de aumentar a ingesta proteica.
49. Secundigesta com parto prematuro anterior, atualmente com 32 5/7 semanas, vem ao pronto atendimento queixando-se de dor em baixo ventre sem perdas vaginais. Ao exame obstétrico, apresenta 2 contrações rítmicas e dolorosas em 10 minutos, batimentos cardíofetais normais e toque com 3 cm de dilatação. Realizada cardiotocografia com resultado Categoria 1.
- A conduta a ser tomada é:
- (A) terbutalina e sulfato de magnésio.
 - (B) cesariana, se mantiver padrão de cardiotocografia.
 - (C) ampicilina e nifedipina.
 - (D) hiper-hidratação e progesterona via vaginal.
 - (E) corticoterapia e sulfato de magnésio.
50. A gestação gemelar é dizigótica, na sua maioria, e monozigótica quando resulta de apenas 1 óvulo fecundado; sua incidência está aumentada em 2 a 5 vezes quando proveniente de técnicas de reprodução assistida.
- Quanto à natureza dessa divisão celular, a gestação pode ser classificada em:
- (A) gêmeos unidos quando a divisão acontece até o 8º dia.
 - (B) dicoriônica e diamniótica quando a divisão acontece até o 4º dia.
 - (C) monocoriônica e monoamniótica quando a divisão acontece entre o 4º e 8º dia.
 - (D) monocoriônica quando há placentas fundidas.
 - (E) dicoriônicos monoamnióticos quando a divisão acontece em até 12 dias.

51. Primigesta com 34 semanas dá entrada no pronto atendimento com queixa de cefaleia de início súbito associada a edema generalizado. PA: 160 x 110 mmHg. Cardiotocografia categoria 1, líquido normal a ultrassonografia e peso fetal adequado para idade gestacional.

Assinale a alternativa correta frente a esse quadro clínico.

- (A) Realizar hidralazina e indução do parto com misoprostol.
- (B) Se os exames forem normais, considerar como crise hipertensiva e medicar com nifedipina sublingual.
- (C) Reavaliar em 2 horas e, se mantiver o quadro, realizar a cesariana de emergência.
- (D) Deve-se receitar anti-hipertensivos por via oral e retornar em 3 dias.
- (E) Deve-se internar a paciente para sulfato de magnésio e resolução da gestação via alta.

52. Assinale a alternativa correta sobre a assistência a uma mãe com dificuldades para que o aleitamento continue.

- (A) Nos casos de ingurgitamento mamário a primeira medida é utilizar bombas elétricas.
- (B) Exercícios de Hoffman apresentam embasamento científico para a prevenção das rachaduras dos mamilos.
- (C) Se houver traumatismo mamilar deve-se lavar com soro fisiológico após todas as mamadas.
- (D) Nos casos de hipogalactia podem ser indicadas a metoclopramida e/ou domperidona.
- (E) São orientações adequadas: a pega correta, a livre demanda e o oferecimento das mamas de forma não alternada desde o parto.

53. A respeito da embriogênese e desenvolvimento fetal é correto afirmar que

- (A) ao redor da 20ª semana de gestação haverá entre 6 a 7 milhões de células germinativas, sendo que apenas 1 a 2 milhões ao nascimento permanecerão quiescentes no estado de prófase.
- (B) os ductos mesonéfricos desenvolvem-se no feto masculino.
- (C) a diferenciação do ducto de Muller em útero, trompas e porção superiores da vagina é dependente do ovário.
- (D) a hidátide de Morgagni é um apêndice vesicular que persiste na parte craniana do ducto mesonéfrico.
- (E) pode ocorrer virilização do feto feminino se a mãe for exposta a níveis elevados de androgênios, especialmente após a 12ª semana de gestação.

54. Gestante, 38 anos, em gestação inicial, queixando-se de sangramento vaginal em pequena intensidade. Ao exame físico corada e hidratada. Ao toque vaginal o colo é impérvio e o útero está com volume levemente aumentado. Refere que há 21 dias realizou ultrassonografia mostrando saco gestacional com vesícula vitelínica.

Com relação ao diagnóstico desta paciente mediante aos achados ultrassonográficos:

- (A) ultrassonografia com endométrio de 12 mm sem fluxo ao Power doppler – aborto incompleto.
- (B) diâmetro médio de saco gestacional 15 mm e ausência de embrião – aborto completo.
- (C) não visualização de embrião com batimento cardíaco – gestação não evolutiva.
- (D) ultrassonografia com embrião com batimentos de 75 bpm – bom prognóstico gestacional.
- (E) presença de embrião com 5 mm sem batimentos cardíacos – gestação inviável.

55. Assinale alternativa que apresenta alterações cromossômicas ou doenças que costumam estar associadas aos achados ultrassonográficos anormais.

- (A) Toxoplasmose; microcefalia.
- (B) Síndrome de Patau; tetralogia de Fallot.
- (C) Síndrome de Down; fêmur curto.
- (D) Síndrome de Edwards; higroma cístico.
- (E) Diabetes; anencefalia.


Leia o caso a seguir para responder às questões de números **56 a 60**.

Secundigesta com 1 cesariana anterior com 41 semanas de gestação vem para consulta de rotina de pré-natal aguardando ter um parto normal. Ao exame físico AU = 35 cm, batimentos cardíofetais 140 bpm, dinâmica uterina ausente. Ao toque vaginal, colo pérvio para 1 cm, médio, medianizado, polo cefálico fixo em -2 de De Lee. Realizada cardiocografia – categoria 1.

56. A conduta indicada é:

- (A) retornos a cada 2 ou 3 dias até 42 semanas.
- (B) cesariana pelas condições desfavoráveis e contraindicação absoluta para indução.
- (C) misoprostol em dose baixa.
- (D) descolar bolsa e retorno em trabalho de parto.
- (E) método de Krause com sonda de Foley.

57. A paciente passou a apresentar contrações ritmadas e ocorreu dilatação cervical para 3 cm. Evoluiu com o seguinte partograma:




(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

O diagnóstico e conduta adequados para o caso são respectivamente:

- (A) distocia funcional – amniotomia.
 (B) vício pélvico – cesariana.
 (C) parada secundária da dilatação – cesariana
 (D) período pélvico prolongado – fórcepe.
 (E) fase ativa prolongada – ocitocina.
58. Após o parto dessa paciente, o obstetra foi chamado, pois ela apresentava sangramento vaginal profuso. O parto acabou ocorrendo por cesariana há aproximadamente 1 hora. Ao exame a paciente encontrava-se descorada, desidratada com PA 65 x 45 mmHg, o útero estava amolecido acima da cicatriz umbilical. A enfermeira já havia aumentado o gotejamento da ocitocina. Qual é a conduta correta?
- (A) Reabordar a paciente imediatamente, realizando a sutura de B-Lynch.
 (B) A intervenção mais importante é a compressão uterina bimanual.
 (C) Utilizar o balão intrauterino por 48 horas.
 (D) Realizar misoprostol retal e, caso não resolva, optar pela histerectomia.
 (E) Histerectomia total ou subtotal, paciente com prole constituída.

59. Internando uma primigesta em trabalho de parto com 5 cm de dilatação e conhecendo a fisiologia de um caso como esse, pode-se esperar que

- (A) ela esteja na fase ativa e o tempo para progredir para dilatação total seja de 3 horas.
 (B) ela esteja no segundo estágio do trabalho de parto e que a expulsão deva ocorrer em até 3 horas, caso receba analgesia de parto.
 (C) a descida do feto inicie-se após a dilatação completa ou somente no final da fase de dilatação.
 (D) seja necessária a rotura oportuna das membranas ovulares e o início da ocitocina para evitar a distocia.
 (E) a analgesia seja oferecida a essa paciente a depender de seu limiar de dor, pois está na fase ativa.
60. A paciente em questão apresentava a seguinte cardiocardiografia intraparto. Analise-a e assinale alternativa que apresenta a conduta a ser tomada.



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

- (A) Categoria 3; realizar cesariana de urgência.
 (B) Taquissistolia; oferecer analgésicos.
 (C) Categoria 2; modificar decúbito; glicose; oxigênio inalatório.
 (D) Padrão tranquilizador com DIP 1; ofertar ocitocina.
 (E) Padrão tranquilizador com feto ativo; manter conduta.

