



EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

CONCURSO DE ADMISSÃO/2023
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2024

027. PROVA OBJETIVA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS

ESPECIALIDADE: OTORRINOLARINGOLOGIA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Assinale a alternativa correta sobre o conteúdo da Portaria nº 1.823/2012.

- (A) Uma das estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) é a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores utilizando exclusivamente base de dados secundários.
- (B) Uma das estratégias da PNSTT é a integração da Vigilância em Saúde do Trabalhador com a atenção especializada.
- (C) As ações em saúde do trabalhador e da trabalhadora nos serviços de urgência e emergência se restringem ao preenchimento do laudo e ao exame médico da Comunicação de Acidente do Trabalho.
- (D) O estímulo à participação da comunidade se dá por meio de convocação de todos os trabalhadores do mercado formal.
- (E) Ela estrutura a Rede Nacional de Atenção Integral de Saúde do Trabalhador (RENAST) no contexto da Rede de Atenção à Saúde (RAS), dentre outras estratégias.

02. A equipe de saúde de uma UBS constata que Joelma está grávida em decorrência de uma situação de violência sexual. Assinale a alternativa correta.

- (A) A experiência mostra que a interrupção da gravidez é seguida de arrependimento, de forma que a equipe de saúde deve tentar sensibilizar Joelma para outras opções.
- (B) Joelma deve ser informada quanto às possibilidades alternativas à interrupção da gravidez, como a assistência pré-natal e entrega da criança para adoção.
- (C) Joelma deve ser imediatamente encaminhada para a interrupção da gravidez antes que o tempo para providências nesse sentido seja ultrapassado.
- (D) Como geralmente há trauma psicológico, detalhes sobre forma(s) de constrangimento utilizada(s) não devem ser solicitados.
- (E) Joelma deve ser encaminhada para o atendimento psicológico logo na primeira consulta, pois o procedimento é obrigatório.

03. Assinale a alternativa correta sobre a Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Todas as informações da saúde entre gestores e trabalhadores da saúde, pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes áreas devem ser trocadas presencialmente.
- (B) Acolhimento do usuário é identificar sua necessidade e peculiaridade e deve ser conduzida pelo profissional médico.
- (C) Todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele, de ser informado sobre sua saúde e deve compartilhar sua dor e alegria com sua rede social como processo terapêutico.
- (D) Cogestão expressa a inclusão dos usuários nos processos de análise, decisão e responsabilidade iguais na gestão e divisão de tarefas administrativas de um serviço de saúde.
- (E) A cogestão é favorecida pelas rodas de conversa para colocar as diferenças em contato de modo a produzir movimentos de desestabilização que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de atenção.

04. Um jovem, vítima de um acidente de motocicleta, chega a um serviço de urgência com quadro de queda da pressão arterial, com hemoglobina baixa, dor à palpação de abdômen e distensão abdominal. É encaminhado para laparotomia e durante a cirurgia tem uma parada cardíaca. Verifica-se rompimento de fígado e baço. Assinale a alternativa correta quanto à causa básica a ser registrada na declaração de óbito.

- (A) Hipovolemia.
- (B) Parada cardiorrespiratória.
- (C) Rompimento de vísceras.
- (D) Anemia aguda.
- (E) Motociclista traumatizado em um acidente de transporte.

05. Assinale a alternativa correta sobre o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável.

- (A) A promoção do aleitamento materno exclusivo para os bebês de baixo peso e/ou pré-termos deve ser feita somente quando há aceitação familiar dessa prática.
- (B) A prática do aleitamento materno depende basicamente das orientações corretas fornecidas às mães pela equipe de saúde da maternidade.
- (C) O aleitamento materno exclusivo deve ser praticado até os 6 meses e complementado com alimentos apropriados até os 2 anos ou mais.
- (D) Entre os 4 e 6 meses de idade, a criança deve receber complementarmente ao aleitamento materno, alimentos levemente adocicados, mais suaves ao paladar.
- (E) O aleitamento materno exclusivo é preconizado para todas as crianças até os 4 meses de idade, devendo ser complementado a partir dessa idade.

- 06.** Assinale a alternativa correta sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM).
- (A) No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde no século XIX, juntamente com a saúde das crianças.
 - (B) Segundo a PNAISM, gênero como elemento constitutivo das relações sociais entre homens e mulheres, é uma construção social e histórica.
 - (C) Os primeiros programas materno-infantis tinham suas metas definidas pelos níveis federal, estadual e municipal.
 - (D) O câncer de útero só atinge mulheres heterossexuais, que são dispensadas de exames preventivos.
 - (E) A PNAISM considera que, para as mesmas patologias, as mulheres negras morrem na mesma faixa etária que mulheres e homens brancos, de um modo geral.
- 07.** Um jovem de 22 anos programa uma viagem para a região Amazônica e não se lembra se tomou a vacina contra a febre amarela. Assinale a alternativa correta.
- (A) O jovem deve receber uma dose da vacina cuja composição é de vírus inativado e um reforço a cada 5 anos.
 - (B) Independentemente de qualquer coisa, o jovem deve receber um reforço da vacina, obrigatório a cada 10 anos.
 - (C) Em caso de não ter recebido a vacina contra a febre amarela até essa idade, não há mais indicação, pois ele deve ser imune por doença assintomática.
 - (D) Viagens para a região Amazônica não requerem cuidados especiais para febre amarela.
 - (E) O jovem deve receber uma dose única da vacina, cuja composição é de vírus atenuado.
- 08.** Assinale a alternativa correta referente ao acesso aos serviços e às ações do SUS.
- (A) Mesmo em situações não previstas, como um dia em que a quantidade de atendimentos está abaixo do esperado, a demanda espontânea deve ser agendada para atendimento posterior, o que faz parte da educação sanitária.
 - (B) O respeito rigoroso da ordem de chegada no acolhimento à demanda espontânea tem se mostrado o melhor critério para obedecer ao princípio de justiça e equidade.
 - (C) O atendimento das urgências em uma UBS é muito semelhante ao atendimento em unidades de pronto-socorro ou pronto atendimento em todos os aspectos.
 - (D) O acesso com equidade deve ser uma preocupação constante no acolhimento à demanda espontânea, entendendo-se equidade como um princípio de justiça, de que é preciso tratar diferentemente os desiguais.
 - (E) Pode-se afirmar que atualmente não há práticas que resultam em restrição do acesso da população no SUS, como filas para o atendimento e distribuição de senhas.
- 09.** Assinale a alternativa que contenha agravos relacionados predominantemente à população masculina.
- (A) Suicídios e mortes por causas externas.
 - (B) Tentativas de suicídio e doenças pulmonares obstrutivas crônicas.
 - (C) Episódios depressivos e tuberculose.
 - (D) Tabagismo e *burnout*.
 - (E) Violência sexual e homicídios.
- 10.** Assinale a alternativa correta sobre o sarampo.
- (A) É de notificação imediata, e o tratamento conta com um medicamento específico para a doença, que deve ser administrado via endovenosa.
 - (B) É de notificação imediata, e recomenda-se a administração da vitamina A em todas as crianças acometidas pela doença, para reduzir a ocorrência de casos graves e fatais, no mesmo dia do diagnóstico do sarampo.
 - (C) É de notificação semanal, e o período de incubação costuma ser muito curto, de um dia.
 - (D) É de notificação imediata, e a imunidade passiva conferida por anticorpos transmitidos pela via transplacentária tem duração de 10 anos.
 - (E) É de notificação semanal, e o período de transmissibilidade é de mais de duas semanas.
- 11.** Assinale a alternativa correta sobre a influenza sazonal.
- (A) Dentre outros, tem indicação de tratamento imediato com fosfato de oseltamivir (Tamiflu) somente grávidas com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto.
 - (B) Os principais reservatórios do vírus influenza são, além do homem, os animais domésticos, como cães e gatos.
 - (C) Os vírus tipo A, B, e C sofrem igualmente grandes variações antigênicas e merecem a atenção do Ministério da Saúde para que não haja risco de ocorrência de epidemias por extensos territórios.
 - (D) A transmissão do vírus entre as pessoas ocorre principalmente de modo indireto por meio de secreções e do ar.
 - (E) Os antivirais apresentam de 70 a 90% de eficácia na prevenção da influenza e constituem ferramenta adjuvante da vacinação, mas a quimioprofilaxia indiscriminada não é recomendável, pois pode promover resistência viral.

- 12.** Assinale a alternativa correta sobre doenças diarreicas agudas (DDA).
- (A) A hidratação dos pacientes com DDA deve se dar preferencialmente por via oral.
 - (B) Os exames parasitológicos, cultura de bactérias e pesquisa de vírus em amostras de fezes ajudam pouco na elucidação dos agentes etiológicos.
 - (C) Os quadros clínicos são autolimitados e, portanto, não oferecem riscos significativos à vida dos acometidos.
 - (D) O rotavírus grupo B, um dos vírus envolvidos, atinge adultos e crianças, e a sua transmissão se dá por via fecal-oral, pela água e de pessoa a pessoa.
 - (E) Os surtos de DDA deixaram de ser de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- 13.** Jamil tem 46 anos, está com excesso de peso há 10 anos e trabalha como motorista de ônibus há 15 anos. Não pratica nenhuma atividade física. Seu pai tinha diabetes do tipo 2 e morreu após sofrer um infarto aos 65 anos. Sente-se cansado nos últimos meses, mas não apresenta outros sintomas. Assinale a alternativa correta.
- (A) Jamil tem fatores de risco para diabetes do tipo 2 e deve ser encaminhado para consulta na UBS e rastreamento da doença.
 - (B) Jamil deve ser observado e se apresentar polidipsia e poliúria deve ser investigado para ver se tem diabetes na UBS.
 - (C) O rastreamento ao qual Jamil deve ser submetido é feito necessariamente por médico endocrinologista do ambulatório de especialidades.
 - (D) Jamil deve ser orientado para fazer uma dieta hipocalórica rigorosa para perder peso e, como não tem sintomas de diabetes, ficar sob observação.
 - (E) Jamil deve ser submetido a um check-up completo para prevenção de doenças crônico-degenerativas em geral.
- 14.** Um jovem de 23 anos chega ao serviço de urgência de uma grande cidade sem vida. Apresenta ferimentos em várias partes do corpo, e os amigos que o levaram relatam que ele foi atropelado por um carro. Assinale a alternativa correta.
- (A) Qualquer médico pode preencher a declaração de óbito.
 - (B) O médico do serviço de urgência deve preencher a declaração de óbito.
 - (C) O corpo deve ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito.
 - (D) O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal.
 - (E) O médico do paciente deve ser solicitado a preencher a declaração de óbito.
- 15.** A chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), da família *Togaviridae* e do gênero Alphavirus. Assinale a alternativa correta sobre a doença.
- (A) Não há relatos de casos de transmissão vertical.
 - (B) Não há descrição de casos crônicos.
 - (C) A transmissão se dá através da picada de fêmeas dos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* infectadas pelo CHIKV.
 - (D) A chikungunya tem caráter epidêmico com baixa taxa de morbidade.
 - (E) No Brasil, a transmissão autóctone foi confirmada no início do século XX.
- 16.** Assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos diretos da estratificação de risco e a avaliação de vulnerabilidades.
- (A) Comprovar a importância do profissional de saúde não médico.
 - (B) Abreviar o tempo de sofrimento de uma pessoa.
 - (C) Aumentar a produtividade de uma unidade de saúde.
 - (D) Otimizar o tempo de atendimento de cada profissional de saúde.
 - (E) Comprovar a importância de uma UBS.
- 17.** Assinale a alternativa correta sobre a hipertensão arterial sistêmica (HAS).
- (A) O diagnóstico nem sempre é fácil, e o controle requer medicamentos de alto custo.
 - (B) O incentivo a mudanças no estilo de vida vem sendo abandonado pela alta resistência dos pacientes.
 - (C) Cada vez mais tem se constatado que o controle da doença deve ser feito em ambulatório especializado.
 - (D) Apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce.
 - (E) A aferição da pressão arterial deve ser feita sempre pelo profissional médico.

18. Assinale a alternativa correta sobre a atenção integral à saúde de crianças e adolescentes.

- (A) Na definição das linhas de ação para o atendimento da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente destaca as políticas e os programas de assistência e previdência social.
- (B) As crianças e os adolescentes têm direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a identidade, autonomia, valores e ideias, o direito de opinião e expressão, de buscar refúgio, auxílio e orientação.
- (C) Apesar da Constituição Brasileira de 1988 ter como um de seus princípios norteadores a prevalência dos Direitos Humanos, o cumprimento das obrigações internacionais assumidas é facultativo.
- (D) Os benefícios assistenciais e políticas compensatórias ou inclusivas como estratégias para redução dos riscos e agravos de saúde dos jovens têm se mostrado ineficazes.
- (E) Os adolescentes em conflito com a lei, que cumprem medidas socioeducativas, têm os mesmos direitos que os demais, cabendo às suas famílias a garantia de que sejam realmente efetivados.

19. Assinale a alternativa correta sobre a andropausa.

- (A) Os sintomas clínicos típicos da andropausa são: alterações de humor, com depressão e irritabilidade; distúrbios do sono; aumento da massa magra, volume e força muscular.
- (B) A andropausa está frequentemente associada ao aumento do antígeno prostático específico.
- (C) A andropausa ocorre de forma súbita e atinge aproximadamente 25% dos homens após os 50 anos.
- (D) A ginecomastia ocorre em quase todos os homens na fase na andropausa.
- (E) Trata-se da diminuição gradual dos níveis sanguíneos da testosterona, que acompanha o envelhecimento e pode estar associada à diminuição da libido.

20. Cinco pessoas são atendidas em uma unidade de urgência: um rapaz de 20 anos, vítima de acidente de motocicleta quando entregava uma pizza, sofre uma fratura de braço; uma moça de 23 anos que ia de carona com o rapaz, tem fratura de perna; um senhor de 70 anos, atropelado quando saía de um restaurante com sua esposa; um policial com fratura de tornozelo ao cair em um buraco na rua, quando voltava para casa após um dia de trabalho e um pedreiro com carteira assinada, com fratura de tibia, decorrente de uma queda de altura, quando trabalhava. Assinale a alternativa correta quanto à notificação compulsória no SINAN.

- (A) Apenas o motociclista entregador de pizza deve ser notificado como acidente de trabalho.
- (B) Apenas o pedreiro deve ser notificado como acidente de trabalho.
- (C) O motociclista entregador de pizza, o pedreiro e o policial devem ser notificados como acidentes de trabalho.
- (D) Nenhum dos casos deve ser notificado.
- (E) Apenas o pedreiro e o policial devem ser notificados como acidente de trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Adolescente com quadro gripal evolui com otalgia intensa e otorragia. Na otoscopia, identificam-se lesões bolhosas vermelho-azuladas na membrana timpânica. O tratamento dessa condição deve

- (A) considerar a paracentese para alívio da dor.
- (B) aguardar a definição etiológica para o início do tratamento.
- (C) seguir por cerca de 7 dias, quando as vesículas desaparecem.
- (D) evitar uso de corticosteroides por dificultar a cicatrização da membrana.
- (E) evitar uso de antibióticos tópicos, apenas orais.

22. Com relação às malformações da orelha, assinale a alternativa correta.

- (A) Atresias de conduto e malformações de cadeia ossicular são raras de se encontrar associadas, pois se formam de estruturas diferentes.
- (B) Os erros de formação da orelha externa e média são tardios na gestação, ocorrendo no terceiro trimestre.
- (C) Estenoses congênitas do conduto auditivo externo com diâmetro inferior a 4 mm têm baixo risco de desenvolvimento de colesteatoma.
- (D) A orelha de abano é decorrente de um erro no desenvolvimento das protuberâncias do primeiro e do segundo arcos branquiais.
- (E) É comum a associação de alterações da orelha média e interna em conjunto, já que elas se formam das mesmas porções do ectoderma.

23. O sinal do delta, associado a imagens hiperintensas sem realce, com injeção de contraste no seio sigmoide, são achados tomográficos do osso temporal condizentes com:

- (A) colesteatoma com invasão intracraniana.
- (B) abscesso de Bezold.
- (C) hidrocefalia otogênica.
- (D) mastoidite com empiema subdural.
- (E) tromboflebite de seio venoso.

24. Na pesquisa dos reflexos estapedianos, a identificação do efeito *on-off* indica

- (A) bom prognóstico após paralisia facial periférica.
- (B) sinal de denervação do nervo facial.
- (C) sinais de otosclerose inicial com flutuação da platina.
- (D) presença de disacusia sensorineural severa a profunda.
- (E) sinais de disacusia condutiva severa a profunda.

- 25.** A cirurgia para colocação do implante coclear apresenta uma série de riscos. Para diminuir esses riscos, é fundamental a realização de
- (A) uso tópico de antifúngicos no pós-operatório.
 - (B) vacinação ampla contra meningite.
 - (C) antibioticoterapia endovenosa dias antes do procedimento.
 - (D) testes alérgicos de contato amplos pelo risco de rejeição.
 - (E) uso de profilaxia bacteriana por cerca de 3 semanas.
- 26.** No quadro do reconhecimento médico-legal de uma surdez por perda auditiva induzida por ruído (PAIR), a audiometria tonal deve ser realizada
- (A) após 3 dias do término da exposição ruidosa.
 - (B) em qualquer momento após a exposição ruidosa.
 - (C) após 3 meses do término da exposição ruidosa.
 - (D) entre 24 a 48 horas após a exposição ruidosa.
 - (E) imediatamente após a exposição ruidosa.
- 27.** Criança de 3 anos com atraso de fala é diagnosticada com perda auditiva severa bilateral. Na investigação etiológica, concluiu-se tratar de síndrome de Pendred.
- Nesse caso, qual é o próximo exame a ser realizado?
- (A) BERA, para avaliar as respostas do nervo coclear e limiar auditivo.
 - (B) Pesquisa de função renal, porque a síndrome afeta a filtração glomerular.
 - (C) Laringoscopia, para avaliar fenda palatina completa ou parcial.
 - (D) Tomografia de ossos temporais, para avaliar alargamento de aquedutos.
 - (E) Fundo de olho, para identificar risco de hipertensão intracraniana.
- 28.** O arco reflexo responsável pelo reflexo vestibulo-ocular é formado por 3 neurônios. São eles:
- (A) neurônios do núcleo vestibular, neurônios do fascículo longitudinal medial e neurônios dos núcleos oculomotores.
 - (B) neurônios vestibulares, neurônios do fascículo longitudinal lateral e neurônios dos núcleos oculomotores.
 - (C) neurônios vestibulares, neurônios do fascículo longitudinal medial e neurônios motores.
 - (D) neurônios do núcleo vestibular, neurônios do fascículo longitudinal lateral e neurônios motores.
 - (E) neurônios vestibulares, neurônios do fascículo longitudinal superior e neurônios oculomotores.
- 29.** No paciente com perda auditiva, a vantagem de se realizar resposta auditiva de estado estável é:
- (A) alta especificidade para identificar lesões neurológicas.
 - (B) maior sensibilidade para identificar disacusias severas e profundas.
 - (C) avaliação de microfonismo coclear.
 - (D) pesquisar distúrbios mistos de perda auditiva.
 - (E) a aquisição das respostas é altamente examinador dependente.
- 30.** Paciente com VPPB de canal lateral realizou manobra diagnóstica, identificando um nistagmo horizontal ageotrópico mais intenso ao virar a cabeça para a esquerda.
- Assinale a alternativa que apresenta a correta localização do otólito.
- (A) Canalolitíase do canal lateral esquerdo.
 - (B) Cupulolitíase do canal lateral esquerdo.
 - (C) Cupulolitíase do canal lateral direito.
 - (D) Canalolitíase do canal lateral direito.
 - (E) Não se trata de VPPB de canal lateral.
- 31.** Na síndrome de Lermoyes, é esperado
- (A) hemiparestesia facial durante a crise vertiginosa na doença de Menière.
 - (B) mioclonia facial durante a vertigem na paroxísmia vestibular.
 - (C) zumbido tônico rápido durante a crise vertiginosa da migrânea vestibular.
 - (D) síncope durante as manobras de reposicionamento da vertigem posicional paroxística benigna.
 - (E) melhora dos níveis auditivos durante a crise vertiginosa na doença de Menière.
- 32.** A ativação do sistema trigeminovascular está diretamente associada ao desenvolvimento da migrânea vestibular. Isso porque
- (A) a queda brusca da circulação sanguínea nos núcleos vestibulares determina aumento nas respostas vestibulares.
 - (B) a ativação trigeminovascular causa diminuição do GABA e consequente formação da onda alastrante.
 - (C) a atuação da dopamina frente à ativação trigeminovascular eleva os potenciais de ação do nervo vestibular.
 - (D) as células do gânglio vestibular têm receptores de serotonina, que é o principal neurotransmissor desse sistema.
 - (E) o gânglio espiral é excessivamente estimulado, levando a respostas neuronais periféricas aberrantes.

- 33.** Paciente masculino com lesão mucocutânea em região de columela, erosiva e de aspecto granulomatoso. Foi realizada biópsia, sendo descrita, na avaliação anatomo-patológica, a presença de um tecido rico em macrófagos com leveduras no seu interior.
- O resultado é condizente com o diagnóstico de
- (A) histoplasmose.
 - (B) sarcoidose.
 - (C) rinosinusite fúngica alérgica.
 - (D) tuberculose.
 - (E) sífilis.
- 34.** Com relação à anatomia do ducto lacrimonasal, assinale a alternativa correta.
- (A) O ducto é formado por uma placa óssea do processo lateral da maxila.
 - (B) O átrio do meato nasal médio é posterior ao canal lacrimonasal.
 - (C) A fossa lacrimal localiza-se posteriormente ao processo frontal da maxila.
 - (D) O osso lacrimal é inferior ao processo frontal da maxila.
 - (E) O ducto lacrimonasal é uma estrutura cartilaginosa inserida no meato superior.
- 35.** A descrição a seguir se refere a uma abordagem cirúrgica: “Através da incisão de Lynch, o periósteo e o saco lacrimal são rebatidos, sendo identificada a lâmina papirácea”. Qual das alternativas a seguir descreve uma indicação para ela?
- (A) Carcinoma espinocelular de seio maxilar.
 - (B) Epistaxe anterior volumosa refratária ao tamponamento nasal.
 - (C) Complicação orbitária de rinosinusite Chandler V.
 - (D) Rinosinusite fúngica de seio etmoidal anterior.
 - (E) Pólipo de Killian.
- 36.** O tratamento cirúrgico endonasal das fístulas liquóricas nasais requer alguns cuidados, entre eles:
- (A) realização da manobra de Valsalva ao término do procedimento para verificar a eficácia do enxerto locado.
 - (B) a cabeceira da maca cirúrgica deve estar sem elevações, evitando a perda de fluoresceína rapidamente.
 - (C) a fixação do enxerto pode ser no ponto de drenagem ósseo ou na abertura meníngea.
 - (D) o uso da fluoresceína de alta densidade, que facilita a passagem do corante e auxilia na identificação da área lesada.
 - (E) o uso de múltiplas camadas para fechamento da fístula deve ser evitado, pois isso dificulta a cicatrização do local.
- 37.** Para a realização de um Draf IIA na cirurgia endoscópica de acesso ao seio frontal, é fundamental:
- (A) remoção completa do agger nasi.
 - (B) abertura do assoalho do seio frontal entre a lâmina papirácea e o septo nasal.
 - (C) remoção do frontal beek de ambos os lados das fossas nasais.
 - (D) identificação das fibras do nervo olfatório.
 - (E) realização de janela septal posterior.
- 38.** A dessensibilização à aspirina pode trazer melhora na qualidade de vida dos pacientes com rinosinusite crônica e polipose nasal.
- O melhor momento para sua realização é
- (A) nas semanas que antecedem o procedimento cirúrgico, quando indicado.
 - (B) após a realização do procedimento cirúrgico, quando indicado.
 - (C) assim que ocorre o diagnóstico da doença.
 - (D) associada ao uso de imunobiológicos.
 - (E) antes e após o procedimento cirúrgico, quando indicado.
- 39.** Uma vez realizada a suspeita clínica de rinosinusite fúngica invasiva, o exame complementar com maior sensibilidade para o diagnóstico precoce e complicações é
- (A) cintilografia óssea.
 - (B) provas inflamatórias.
 - (C) tomografia computadorizada.
 - (D) rinomanometria.
 - (E) ressonância magnética.
- 40.** Criança de 5 anos com obstrução nasal crônica e rinorreia recorrente. Na nasofibrosopia, identificaram-se lesões polipoides em ambas as narinas, além de secreção mucopurulenta em meatos médios.
- Qual dos exames a seguir deve ser solicitado?
- (A) Ressonância magnética de encéfalo e provas reumatológicas.
 - (B) Tomografia de seios paranasais e sorologias infecciosas.
 - (C) Mielograma e teste de cloro no suor.
 - (D) Tomografia de seios paranasais e pesquisa genética para CFTR.
 - (E) Ressonância magnética de encéfalo e biópsia.

41. Espirros e rinorreia podem ser considerados uma resposta nasal normal em indivíduos expostos ao frio ou ao ar poluído. Clinicamente, uma das formas de se diferenciar essa resposta normal da rinite vasomotora é que, na doença, os sintomas duram
- (A) mais de 1 hora por dia, por pelo menos 5 dias, durante um período de 14 dias.
 - (B) menos de 30 minutos por dia, por pelo menos 5 dias, durante um período de 14 dias.
 - (C) mais de 1 hora por dia, por pelo menos 3 dias, durante um período de 14 dias.
 - (D) mais de 1 hora por dia, por pelo menos 3 dias, durante um período de 7 dias.
 - (E) mais de 1 hora por dia, por pelo menos 2 dias, durante um período de 7 dias.
42. Com relação as mucocelas das cavidades nasossinais, é correto afirmar:
- (A) são mais comuns nas primeiras décadas de vida pela elevada associação com outras malformações.
 - (B) homens são mais acometidos que mulheres, tendo importante associação a níveis hormonais.
 - (C) cursam com remodelamento e destruição óssea, podendo atingir órgãos adjacentes.
 - (D) são formadas por epitélio ciliar e ocupam completamente o seio acometido.
 - (E) os seios maxilares são os mais acometidos, seguidos pelos seios fronto-etmoidais.
43. O sinal de Holman-Muller ocorre em qual das doenças a seguir?
- (A) Rinossinusite fúngica invasiva.
 - (B) Papiloma invertido.
 - (C) Carcinoma espinocelular maxilo-etmoidal.
 - (D) Mucocele maxilar.
 - (E) Nasoangiofibroma.
44. Criança de 2 anos realiza nasofibrolaringoscopia, identificando paralisia de ambas as pregas vocais em posição paramediana. O exame que deve ser prontamente realizado e a hipótese diagnóstica mais comum são, correta e respectivamente:
- (A) ressonância de encéfalo – Arnold-Chiari.
 - (B) avaliação do fundo de olho – lesão do núcleo ambíguo.
 - (C) ecocardiografia – malformações cardiovasculares.
 - (D) eletromiografia laríngea – disfunção espástica muscular.
 - (E) tomografia da coluna torácica – trauma de parto.
45. Mulher de 25 anos com dificuldade respiratória, estridor que piora ao deitar e cansaço, sem disfonia. Laringoscopia mostrou movimentação paradoxal das pregas vocais durante a inspiração. Durante a manobra de *sniff*, houve abertura total das pregas vocais.
- Nesse caso, é fundamental:
- (A) realizar a tireoplastia como primeira linha de tratamento.
 - (B) realizar eletromiografia laríngea para avaliar músculos adutores.
 - (C) pesquisar sintomas associados ao Parkinson.
 - (D) realizar fortalecimento dos músculos extrínsecos da laringe.
 - (E) instituir tratamento com relaxantes musculares.
46. Segundo a classificação de Myer-Cotton para estenoses subglóticas, o comprometimento entre 70 e 90% da área é chamado de grau
- (A) IV.
 - (B) V.
 - (C) III.
 - (D) II.
 - (E) I.
47. Com relação às técnicas de redução da produção de saliva para pacientes disfágicos, assinale a alternativa correta.
- (A) A miotomia do músculo cricofaríngeo é indicada na presença de hipotonia do componente parassimpático faríngeo.
 - (B) A toxina botulínica deve ser aplicada apenas na glândula parótida devido ao elevado risco de lesão em glândulas menores.
 - (C) A parassimpatectomia pode ser realizada através da secção do nervo corda do tímpano e do nervo de Jacobson.
 - (D) A ressecção das glândulas parótidas é padrão-ouro para o controle da produção salivar.
 - (E) A radioterapia é um método eficaz em quadros mais graves com baixo risco de complicações.
48. A cordectomia total é a ressecção da prega vocal até qual parâmetro anatômico?
- (A) Prege vestibular.
 - (B) Pericôndrio da cartilagem cricoide.
 - (C) Plano do músculo vocal.
 - (D) Pericôndrio da cartilagem tireóidea.
 - (E) Ligamento vocal.

49. Assinale a alternativa que descreve adequadamente uma lesão de prega vocal e seu achado anatomopatológico.
- (A) Sulco bolsa: forrada por epitélio pseudoestratificado colunar, com descamação no seu interior e sendo possível de desenvolver processos inflamatórios ou infecciosos.
 - (B) Sulco estria maior: desorganização do epitélio da prega vocal com união deste ao ligamento vocal.
 - (C) Ponte mucosa: epitélio estratificado rico em queratina e glândulas mucosas.
 - (D) Papiloma: epitélio pseudoestratificado desorganizado com bolsas ricas em neutrófilos.
 - (E) Cisto epidermoide: revestido por epitélio estratificado, contém queratina e cristais de colesterol.
50. Homem de 60 anos com quadro de disфония caracterizada por diminuição da loudness, fala monótona, voz rouca e soprosa. Laringoscopia mostra movimento simétrico das pregas vocais com fenda fusiforme e tremor no repouso vocal.
- O diagnóstico desse paciente é classificado como disфония neurológica
- (A) espástica.
 - (B) hipocinética.
 - (C) rítmica.
 - (D) arrítmica.
 - (E) paroxística.
51. Criança com lesão na linha média da face anterior do pescoço. Após quadro gripal, notou aumento importante da lesão, que se eleva no pescoço quando a criança realiza a protrusão da língua.
- A cirurgia para ressecção dessa lesão deve
- (A) fixar o plano muscular na cartilagem cricóideia.
 - (B) realizar marsupialização completa.
 - (C) preencher o trajeto da lesão com ácido hialurônico.
 - (D) retirar a parte central do osso hioide.
 - (E) realizar incisão em quilha na cartilagem tireóideia.
52. Nos casos de câncer de laringe dos tipos T1 e T2 com pescoço negativo para linfonodos acometidos, o esvaziamento cervical depende do sítio primário da lesão, sendo indicado:
- (A) Esvaziamento cervical seletivo homolateral nas lesões T2 infraglóticas.
 - (B) Esvaziamento cervical seletivo bilateral nas lesões T1 e T2 supraglóticas.
 - (C) Preservação dos linfonodos nas lesões T1 e T2 das lesões supraglóticas.
 - (D) Preservação de linfonodos cervicais das lesões T1 e T2 infraglóticas.
 - (E) Esvaziamento cervical seletivo homolateral nas lesões T2 glóticas.
53. Com relação aos tumores malignos nasossinusais, assinale a alternativa correta.
- (A) Tumores epiteliais indiferenciados são o tipo histológico mais comum.
 - (B) A incidência é maior em mulheres na quarta década de vida.
 - (C) O principal sintoma dos tumores de fossa nasal é a obstrução nasal unilateral.
 - (D) A localização mais frequente de origem é a fossa nasal, e não os seios paranasais.
 - (E) O diagnóstico precoce dos tumores sinusais é comum, visto que a doença é muito sintomática.
54. O exame padrão-ouro para o diagnóstico do despertar relacionado ao esforço respiratório (RERA) é:
- (A) avaliação de múltiplas latências.
 - (B) oximetria de noite inteira.
 - (C) polissonografia com balão de pressão esofágica.
 - (D) polissonografia *split-night*.
 - (E) sonoendoscopia.
55. Durante a polissonografia, os seguintes eventos podem ser avaliados:
- (A) apneia: caracteriza-se pela diminuição do fluxo aéreo em, no mínimo, 8%.
 - (B) despertar associado ao aumento do esforço respiratório (DRFR): caracterizado pelo despertar com aumento do esforço respiratório decorrente de uma hipopneia.
 - (C) hipopneia: diminuição do fluxo aéreo acima de 50% do basal associada por mais de 10 segundos.
 - (D) despertar associado ao aumento do esforço respiratório (DRFR): caracterizado pelo despertar decorrente do movimento de pernas durante sono profundo.
 - (E) hipopneia: diminuição do fluxo aéreo acima de 30% do basal associada à queda acima de 4% de SpO₂ por mais de 10 segundos.

- 56.** Mulher de 32 anos notou, há 3 semanas, uma linha branca superficial em ambas as mucosas jugais, sem dor ou sangramento. Dentição em bom aspecto, assim como língua e palato.
- Quanto à orientação que precisa ser dada nessa situação, assinale a alternativa correta.
- (A) Solicitar avaliação com dentista e controle de bruxismo.
 - (B) Observar a presença de lesões com a mesma característica em região genital.
 - (C) A realização de biópsia é importante por se tratar de lesão persistente por mais de 15 dias.
 - (D) Solicitar avaliação com pneumologista pelo risco de acometimento pulmonar.
 - (E) Limpeza da cavidade oral e uso de antifúngico tópico.
- 57.** Homem de 42 anos que trabalha como salva-vidas em uma praia refere áreas ressecadas no lábio inferior com uma pequena área mais esbranquiçada, atrófica e escamosa, indolor ao toque, que vem aumentando na transição com a pele. Nega tabagismo. O diagnóstico principal e a conduta mais adequada são, respectivamente:
- (A) queilite actínica – proteção solar, crioterapia e pomada de corticoide.
 - (B) queilite actínica – biópsia, proteção solar e seguimento clínico.
 - (C) queilite traumática – biópsia, laser de CO₂ e vitamina A.
 - (D) queilite traumática – proteção solar, pomada de corticoide e evitar trauma.
 - (E) carcinoma espinocelular – proteção solar, crioterapia e exames laboratoriais.
- 58.** Com relação às lesões melanocíticas da cavidade oral, assinale a alternativa correta.
- (A) A região mais acometida pelo melanoma na cavidade oral é o lábio inferior.
 - (B) A síndrome de Laugier-Hunziker é uma hiperpigmentação oral associada à hipopigmentação das unhas.
 - (C) Na doença de Addison gera máculas planas por toda a cavidade oral por alteração da função tireoideana.
 - (D) A síndrome de Peutz-Jeghers é caracterizada por manchas castanho-claras e enegrecidas.
 - (E) A pigmentação melânica étnica é associada diretamente à etnia afrodescendente.
- 59.** Faz parte do critério diagnóstico da síndrome de Sjogren primária:
- (A) anti Ro, FAN e anti-SSA positivos.
 - (B) teste de Shirmer menor ou igual a 5 mm/5 min em pelo menos 1 olho.
 - (C) taxa de fluxo salivar não estimulado menor que 0,5 mL/min.
 - (D) glândula salivar labial com infarto vascular em 1 foco a cada 4 mm.
 - (E) coloração ocular em ao menos 3 pontos em pelo menos 1 olho.
- 60.** Homem de 35 anos sofreu queda de cerca de 3 metros, com trauma da região frontal do crânio com fratura associada. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta com relação ao tratamento dessa fratura.
- (A) Se houve apenas fratura da tábua externa, mesmo com deslocamento dos fragmentos ósseos, a conduta é expectante.
 - (B) Se houve apenas fratura da tábua externa sem deslocamento dos fragmentos ósseos, a cirurgia por acesso endoscópico é a melhor opção.
 - (C) Se houve fratura da parede posterior com lesão menor que 25% da sua extensão, realiza-se a obliteração do seio e ducto nasofrontal.
 - (D) Se houve apenas fratura da tábua externa com deslocamento dos fragmentos, a conduta é a obliteração do seio frontal, além da correção óssea.
 - (E) Se houve fratura da parede posterior, a cranialização do seio é conduta mandatória.

