



**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO**

CONCURSO DE ADMISSÃO/2023  
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE/2024

**027. PROVA OBJETIVA**

**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MÉDICOS**

**ESPECIALIDADE: OTORRINOLARINGOLOGIA**

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Certifique-se de que a letra referente ao modelo de sua prova é igual àquela constante em sua folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições.
- Caso haja alguma divergência de informação, comunique ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início da prova.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

**01.** Assinale a alternativa correta sobre o conteúdo da Portaria nº 1.823/2012.

- (A) Ela estrutura a Rede Nacional de Atenção Integral de Saúde do Trabalhador (RENAST) no contexto da Rede de Atenção à Saúde (RAS), dentre outras estratégias.
- (B) Uma das estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) é a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores utilizando exclusivamente base de dados secundários.
- (C) Uma das estratégias da PNSTT é a integração da Vigilância em Saúde do Trabalhador com a atenção especializada.
- (D) As ações em saúde do trabalhador e da trabalhadora nos serviços de urgência e emergência se restringem ao preenchimento do laudo e ao exame médico da Comunicação de Acidente do Trabalho.
- (E) O estímulo à participação da comunidade se dá por meio de convocação de todos os trabalhadores do mercado formal.

**02.** A equipe de saúde de uma UBS constata que Joelma está grávida em decorrência de uma situação de violência sexual. Assinale a alternativa correta.

- (A) Joelma deve ser encaminhada para o atendimento psicológico logo na primeira consulta, pois o procedimento é obrigatório.
- (B) Joelma deve ser imediatamente encaminhada para a interrupção da gravidez antes que o tempo para providências nesse sentido seja ultrapassado.
- (C) Como geralmente há trauma psicológico, detalhes sobre forma(s) de constrangimento utilizada(s) não devem ser solicitados.
- (D) Joelma deve ser informada quanto às possibilidades alternativas à interrupção da gravidez, como a assistência pré-natal e entrega da criança para adoção.
- (E) A experiência mostra que a interrupção da gravidez é seguida de arrependimento, de forma que a equipe de saúde deve tentar sensibilizar Joelma para outras opções.

**03.** Assinale a alternativa correta sobre a Política Nacional de Humanização do SUS.

- (A) Acolhimento do usuário é identificar sua necessidade e peculiaridade e deve ser conduzida pelo profissional médico.
- (B) Todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele, de ser informado sobre sua saúde e deve compartilhar sua dor e alegria com sua rede social como processo terapêutico.
- (C) A cogestão é favorecida pelas rodas de conversa para colocar as diferenças em contato de modo a produzir movimentos de desestabilização que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de atenção.
- (D) Todas as informações da saúde entre gestores e trabalhadores da saúde, pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes áreas devem ser trocadas presencialmente.
- (E) Cogestão expressa a inclusão dos usuários nos processos de análise, decisão e responsabilidade iguais na gestão e divisão de tarefas administrativas de um serviço de saúde.

**04.** Um jovem, vítima de um acidente de motocicleta, chega a um serviço de urgência com quadro de queda da pressão arterial, com hemoglobina baixa, dor à palpação de abdômen e distensão abdominal. É encaminhado para laparotomia e durante a cirurgia tem uma parada cardíaca. Verifica-se rompimento de fígado e baço. Assinale a alternativa correta quanto à causa básica a ser registrada na declaração de óbito.

- (A) Anemia aguda.
- (B) Hipovolemia.
- (C) Parada cardiorrespiratória.
- (D) Motociclista traumatizado em um acidente de transporte.
- (E) Rompimento de vísceras.

**05.** Assinale a alternativa correta sobre o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável.

- (A) Entre os 4 e 6 meses de idade, a criança deve receber complementarmente ao aleitamento materno, alimentos levemente adocicados, mais suaves ao paladar.
- (B) O aleitamento materno exclusivo deve ser praticado até os 6 meses e complementado com alimentos apropriados até os 2 anos ou mais.
- (C) O aleitamento materno exclusivo é preconizado para todas as crianças até os 4 meses de idade, devendo ser complementado a partir dessa idade.
- (D) A prática do aleitamento materno depende basicamente das orientações corretas fornecidas às mães pela equipe de saúde da maternidade.
- (E) A promoção do aleitamento materno exclusivo para os bebês de baixo peso e/ou pré-termos deve ser feita somente quando há aceitação familiar dessa prática.

- 06.** Assinale a alternativa correta sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM).
- (A) Segundo a PNAISM, gênero como elemento constitutivo das relações sociais entre homens e mulheres, é uma construção social e histórica.
  - (B) O câncer de útero só atinge mulheres heterossexuais, que são dispensadas de exames preventivos.
  - (C) No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde no século XIX, juntamente com a saúde das crianças.
  - (D) A PNAISM considera que, para as mesmas patologias, as mulheres negras morrem na mesma faixa etária que mulheres e homens brancos, de um modo geral.
  - (E) Os primeiros programas materno-infantis tinham suas metas definidas pelos níveis federal, estadual e municipal.
- 07.** Um jovem de 22 anos programa uma viagem para a região Amazônica e não se lembra se tomou a vacina contra a febre amarela. Assinale a alternativa correta.
- (A) Independentemente de qualquer coisa, o jovem deve receber um reforço da vacina, obrigatório a cada 10 anos.
  - (B) Viagens para a região Amazônica não requerem cuidados especiais para febre amarela.
  - (C) O jovem deve receber uma dose da vacina cuja composição é de vírus inativado e um reforço a cada 5 anos.
  - (D) Em caso de não ter recebido a vacina contra a febre amarela até essa idade, não há mais indicação, pois ele deve ser imune por doença assintomática.
  - (E) O jovem deve receber uma dose única da vacina, cuja composição é de vírus atenuado.
- 08.** Assinale a alternativa correta referente ao acesso aos serviços e às ações do SUS.
- (A) O acesso com equidade deve ser uma preocupação constante no acolhimento à demanda espontânea, entendendo-se equidade como um princípio de justiça, de que é preciso tratar diferentemente os desiguais.
  - (B) O atendimento das urgências em uma UBS é muito semelhante ao atendimento em unidades de pronto-socorro ou pronto atendimento em todos os aspectos.
  - (C) O respeito rigoroso da ordem de chegada no acolhimento à demanda espontânea tem se mostrado o melhor critério para obedecer ao princípio de justiça e equidade.
  - (D) Pode-se afirmar que atualmente não há práticas que resultam em restrição do acesso da população no SUS, como filas para o atendimento e distribuição de senhas.
  - (E) Mesmo em situações não previstas, como um dia em que a quantidade de atendimentos está abaixo do esperado, a demanda espontânea deve ser agendada para atendimento posterior, o que faz parte da educação sanitária.
- 09.** Assinale a alternativa que contenha agravos relacionados predominantemente à população masculina.
- (A) Tabagismo e *burnout*.
  - (B) Violência sexual e homicídios.
  - (C) Suicídios e mortes por causas externas.
  - (D) Tentativas de suicídio e doenças pulmonares obstrutivas crônicas.
  - (E) Episódios depressivos e tuberculose.
- 10.** Assinale a alternativa correta sobre o sarampo.
- (A) É de notificação semanal, e o período de transmissibilidade é de mais de duas semanas.
  - (B) É de notificação imediata, e o tratamento conta com um medicamento específico para a doença, que deve ser administrado via endovenosa.
  - (C) É de notificação imediata, e recomenda-se a administração da vitamina A em todas as crianças acometidas pela doença, para reduzir a ocorrência de casos graves e fatais, no mesmo dia do diagnóstico do sarampo.
  - (D) É de notificação semanal, e o período de incubação costuma ser muito curto, de um dia.
  - (E) É de notificação imediata, e a imunidade passiva conferida por anticorpos transmitidos pela via transplacentária tem duração de 10 anos.
- 11.** Assinale a alternativa correta sobre a influenza sazonal.
- (A) A transmissão do vírus entre as pessoas ocorre principalmente de modo indireto por meio de secreções e do ar.
  - (B) Os antivirais apresentam de 70 a 90% de eficácia na prevenção da influenza e constituem ferramenta adjuvante da vacinação, mas a quimioprofilaxia indiscriminada não é recomendável, pois pode promover resistência viral.
  - (C) Dentre outros, tem indicação de tratamento imediato com fosfato de oseltamivir (Tamiflu) somente grávidas com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto.
  - (D) Os principais reservatórios do vírus influenza são, além do homem, os animais domésticos, como cães e gatos.
  - (E) Os vírus tipo A, B, e C sofrem igualmente grandes variações antigênicas e merecem a atenção do Ministério da Saúde para que não haja risco de ocorrência de epidemias por extensos territórios.

12. Assinale a alternativa correta sobre doenças diarreicas agudas (DDA).
- (A) Os quadros clínicos são autolimitados e, portanto, não oferecem riscos significativos à vida dos acometidos.
  - (B) A hidratação dos pacientes com DDA deve se dar preferencialmente por via oral.
  - (C) Os surtos de DDA deixaram de ser de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
  - (D) Os exames parasitológicos, cultura de bactérias e pesquisa de vírus em amostras de fezes ajudam pouco na elucidação dos agentes etiológicos.
  - (E) O rotavírus grupo B, um dos vírus envolvidos, atinge adultos e crianças, e a sua transmissão se dá por via fecal-oral, pela água e de pessoa a pessoa.
13. Jamil tem 46 anos, está com excesso de peso há 10 anos e trabalha como motorista de ônibus há 15 anos. Não pratica nenhuma atividade física. Seu pai tinha diabetes do tipo 2 e morreu após sofrer um infarto aos 65 anos. Sente-se cansado nos últimos meses, mas não apresenta outros sintomas. Assinale a alternativa correta.
- (A) Jamil deve ser orientado para fazer uma dieta hipocalórica rigorosa para perder peso e, como não tem sintomas de diabetes, ficar sob observação.
  - (B) O rastreamento ao qual Jamil deve ser submetido é feito necessariamente por médico endocrinologista do ambulatório de especialidades.
  - (C) Jamil deve ser submetido a um check-up completo para prevenção de doenças crônico-degenerativas em geral.
  - (D) Jamil tem fatores de risco para diabetes do tipo 2 e deve ser encaminhado para consulta na UBS e rastreamento da doença.
  - (E) Jamil deve ser observado e se apresentar polidipsia e poliúria deve ser investigado para ver se tem diabetes na UBS.
14. Um jovem de 23 anos chega ao serviço de urgência de uma grande cidade sem vida. Apresenta ferimentos em várias partes do corpo, e os amigos que o levaram relatam que ele foi atropelado por um carro. Assinale a alternativa correta.
- (A) O médico do paciente deve ser solicitado a preencher a declaração de óbito.
  - (B) O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal.
  - (C) Qualquer médico pode preencher a declaração de óbito.
  - (D) O corpo deve ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito.
  - (E) O médico do serviço de urgência deve preencher a declaração de óbito.
15. A chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), da família *Togaviridae* e do gênero *Alphavirus*. Assinale a alternativa correta sobre a doença.
- (A) No Brasil, a transmissão autóctone foi confirmada no início do século XX.
  - (B) A transmissão se dá através da picada de fêmeas dos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* infectadas pelo CHIKV.
  - (C) Não há descrição de casos crônicos.
  - (D) Não há relatos de casos de transmissão vertical.
  - (E) A chikungunya tem caráter epidêmico com baixa taxa de morbidade.
16. Assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos diretos da estratificação de risco e a avaliação de vulnerabilidades.
- (A) Otimizar o tempo de atendimento de cada profissional de saúde.
  - (B) Comprovar a importância do profissional de saúde não médico.
  - (C) Comprovar a importância de uma UBS.
  - (D) Aumentar a produtividade de uma unidade de saúde.
  - (E) Abreviar o tempo de sofrimento de uma pessoa.
17. Assinale a alternativa correta sobre a hipertensão arterial sistêmica (HAS).
- (A) Cada vez mais tem se constatado que o controle da doença deve ser feito em ambulatório especializado.
  - (B) A aferição da pressão arterial deve ser feita sempre pelo profissional médico.
  - (C) Apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce.
  - (D) O diagnóstico nem sempre é fácil, e o controle requer medicamentos de alto custo.
  - (E) O incentivo a mudanças no estilo de vida vem sendo abandonado pela alta resistência dos pacientes.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

18. Assinale a alternativa correta sobre a atenção integral à saúde de crianças e adolescentes.
- (A) As crianças e os adolescentes têm direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a identidade, autonomia, valores e ideias, o direito de opinião e expressão, de buscar refúgio, auxílio e orientação.
  - (B) Apesar da Constituição Brasileira de 1988 ter como um de seus princípios norteadores a prevalência dos Direitos Humanos, o cumprimento das obrigações internacionais assumidas é facultativo.
  - (C) Os benefícios assistenciais e políticas compensatórias ou inclusivas como estratégias para redução dos riscos e agravos de saúde dos jovens têm se mostrado ineficazes.
  - (D) Os adolescentes em conflito com a lei, que cumprem medidas socioeducativas, têm os mesmos direitos que os demais, cabendo às suas famílias a garantia de que sejam realmente efetivados.
  - (E) Na definição das linhas de ação para o atendimento da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente destaca as políticas e os programas de assistência e previdência social.
19. Assinale a alternativa correta sobre a andropausa.
- (A) A ginecomastia ocorre em quase todos os homens na fase na andropausa.
  - (B) Os sintomas clínicos típicos da andropausa são: alterações de humor, com depressão e irritabilidade; distúrbios do sono; aumento da massa magra, volume e força muscular.
  - (C) Trata-se da diminuição gradual dos níveis sanguíneos da testosterona, que acompanha o envelhecimento e pode estar associada à diminuição da libido.
  - (D) A andropausa ocorre de forma súbita e atinge aproximadamente 25% dos homens após os 50 anos.
  - (E) A andropausa está frequentemente associada ao aumento do antígeno prostático específico.
20. Cinco pessoas são atendidas em uma unidade de urgência: um rapaz de 20 anos, vítima de acidente de motocicleta quando entregava uma pizza, sofre uma fratura de braço; uma moça de 23 anos que ia de carona com o rapaz, tem fratura de perna; um senhor de 70 anos, atropelado quando saía de um restaurante com sua esposa; um policial com fratura de tornozelo ao cair em um buraco na rua, quando voltava para casa após um dia de trabalho e um pedreiro com carteira assinada, com fratura de tibia, decorrente de uma queda de altura, quando trabalhava. Assinale a alternativa correta quanto à notificação compulsória no SINAN.
- (A) Apenas o pedreiro deve ser notificado como acidente de trabalho.
  - (B) Apenas o pedreiro e o policial devem ser notificados como acidente de trabalho.
  - (C) Apenas o motociclista entregador de pizza deve ser notificado como acidente de trabalho.
  - (D) O motociclista entregador de pizza, o pedreiro e o policial devem ser notificados como acidentes de trabalho.
  - (E) Nenhum dos casos deve ser notificado.
21. Adolescente com quadro gripal evolui com otalgia intensa e otorragia. Na otoscopia, identificam-se lesões bolhosas vermelho-azuladas na membrana timpânica. O tratamento dessa condição deve
- (A) evitar uso de corticosteroides por dificultar a cicatrização da membrana.
  - (B) seguir por cerca de 7 dias, quando as vesículas desaparecem.
  - (C) evitar uso de antibióticos tópicos, apenas orais.
  - (D) aguardar a definição etiológica para o início do tratamento.
  - (E) considerar a paracentese para alívio da dor.
22. Com relação às malformações da orelha, assinale a alternativa correta.
- (A) Os erros de formação da orelha externa e média são tardios na gestação, ocorrendo no terceiro trimestre.
  - (B) Estenoses congênitas do conduto auditivo externo com diâmetro inferior a 4 mm têm baixo risco de desenvolvimento de colesteatoma.
  - (C) Atresias de conduto e malformações de cadeia ossicular são raras de se encontrar associadas, pois se formam de estruturas diferentes.
  - (D) É comum a associação de alterações da orelha média e interna em conjunto, já que elas se formam das mesmas porções do ectoderma.
  - (E) A orelha de abano é decorrente de um erro no desenvolvimento das protuberâncias do primeiro e do segundo arcos branquiais.
23. O sinal do delta, associado a imagens hiperintensas sem realce, com injeção de contraste no seio sigmoide, são achados tomográficos do osso temporal condizentes com:
- (A) mastoidite com empiema subdural.
  - (B) hidrocefalia otogênica.
  - (C) colesteatoma com invasão intracraniana.
  - (D) tromboflebite de seio venoso.
  - (E) abscesso de Bezold.
24. Na pesquisa dos reflexos estapedianos, a identificação do efeito *on-off* indica
- (A) sinal de denervação do nervo facial.
  - (B) sinais de otosclerose inicial com flutuação da platina.
  - (C) presença de disacusia sensorineural severa a profunda.
  - (D) sinais de disacusia condutiva severa a profunda.
  - (E) bom prognóstico após paralisia facial periférica.

- 25.** A cirurgia para colocação do implante coclear apresenta uma série de riscos. Para diminuir esses riscos, é fundamental a realização de
- (A) vacinação ampla contra meningite.
  - (B) testes alérgicos de contato amplos pelo risco de rejeição.
  - (C) uso de profilaxia bacteriana por cerca de 3 semanas.
  - (D) antibioticoterapia endovenosa dias antes do procedimento.
  - (E) uso tópico de antifúngicos no pós-operatório.
- 26.** No quadro do reconhecimento médico-legal de uma surdez por perda auditiva induzida por ruído (PAIR), a audiometria tonal deve ser realizada
- (A) após 3 meses do término da exposição ruidosa.
  - (B) imediatamente após a exposição ruidosa.
  - (C) em qualquer momento após a exposição ruidosa.
  - (D) após 3 dias do término da exposição ruidosa.
  - (E) entre 24 a 48 horas após a exposição ruidosa.
- 27.** Criança de 3 anos com atraso de fala é diagnosticada com perda auditiva severa bilateral. Na investigação etiológica, concluiu-se tratar de síndrome de Pendred.
- Nesse caso, qual é o próximo exame a ser realizado?
- (A) Fundo de olho, para identificar risco de hipertensão intracraniana.
  - (B) Laringoscopia, para avaliar fenda palatina completa ou parcial.
  - (C) Tomografia de ossos temporais, para avaliar alargamento de aquedutos.
  - (D) BERA, para avaliar as respostas do nervo coclear e limiar auditivo.
  - (E) Pesquisa de função renal, porque a síndrome afeta a filtração glomerular.
- 28.** O arco reflexo responsável pelo reflexo vestibulo-ocular é formado por 3 neurônios. São eles:
- (A) neurônios do núcleo vestibular, neurônios do fascículo longitudinal lateral e neurônios motores.
  - (B) neurônios vestibulares, neurônios do fascículo longitudinal superior e neurônios oculomotores.
  - (C) neurônios do núcleo vestibular, neurônios do fascículo longitudinal medial e neurônios dos núcleos oculomotores.
  - (D) neurônios vestibulares, neurônios do fascículo longitudinal lateral e neurônios dos núcleos oculomotores.
  - (E) neurônios vestibulares, neurônios do fascículo longitudinal medial e neurônios motores.
- 29.** No paciente com perda auditiva, a vantagem de se realizar resposta auditiva de estado estável é:
- (A) pesquisar distúrbios mistos de perda auditiva.
  - (B) a aquisição das respostas é altamente examinador dependente.
  - (C) maior sensibilidade para identificar disacusias severas e profundas.
  - (D) alta especificidade para identificar lesões neurológicas.
  - (E) avaliação de microfonismo coclear.
- 30.** Paciente com VPPB de canal lateral realizou manobra diagnóstica, identificando um nistagmo horizontal ageotrópico mais intenso ao virar a cabeça para a esquerda.
- Assinale a alternativa que apresenta a correta localização do otólito.
- (A) Cupulolitíase do canal lateral direito.
  - (B) Canalolitíase do canal lateral direito.
  - (C) Canalolitíase do canal lateral esquerdo.
  - (D) Não se trata de VPPB de canal lateral.
  - (E) Cupulolitíase do canal lateral esquerdo.
- 31.** Na síndrome de Lermoyes, é esperado
- (A) zumbido tônico rápido durante a crise vertiginosa da migrânea vestibular.
  - (B) melhora dos níveis auditivos durante a crise vertiginosa na doença de Menière.
  - (C) mioclonia facial durante a vertigem na paroxísmia vestibular.
  - (D) hemiparestesia facial durante a crise vertiginosa na doença de Menière.
  - (E) síncope durante as manobras de reposicionamento da vertigem posicional paroxística benigna.
- 32.** A ativação do sistema trigeminovascular está diretamente associada ao desenvolvimento da migrânea vestibular. Isso porque
- (A) a atuação da dopamina frente à ativação trigeminovascular eleva os potenciais de ação do nervo vestibular.
  - (B) a queda brusca da circulação sanguínea nos núcleos vestibulares determina aumento nas respostas vestibulares.
  - (C) o gânglio espiral é excessivamente estimulado, levando a respostas neuronais periféricas aberrantes.
  - (D) a ativação trigeminovascular causa diminuição do GABA e consequente formação da onda alastrante.
  - (E) as células do gânglio vestibular têm receptores de serotonina, que é o principal neurotransmissor desse sistema.

- 33.** Paciente masculino com lesão mucocutânea em região de columela, erosiva e de aspecto granulomatoso. Foi realizada biópsia, sendo descrita, na avaliação anátomo-patológica, a presença de um tecido rico em macrófagos com leveduras no seu interior.
- O resultado é condizente com o diagnóstico de
- (A) sarcoidose.
  - (B) tuberculose.
  - (C) sífilis.
  - (D) histoplasmose.
  - (E) rinosinusite fúngica alérgica.
- 34.** Com relação à anatomia do ducto lacrimonasal, assinale a alternativa correta.
- (A) O osso lacrimal é inferior ao processo frontal da maxila.
  - (B) O ducto é formado por uma placa óssea do processo lateral da maxila.
  - (C) O ducto lacrimonasal é uma estrutura cartilaginosa inserida no meato superior.
  - (D) A fossa lacrimal localiza-se posteriormente ao processo frontal da maxila.
  - (E) O átrio do meato nasal médio é posterior ao canal lacrimonasal.
- 35.** A descrição a seguir se refere a uma abordagem cirúrgica: “Através da incisão de Lynch, o periósteo e o saco lacrimal são rebatidos, sendo identificada a lâmina papirácea”. Qual das alternativas a seguir descreve uma indicação para ela?
- (A) Pólipo de Killian.
  - (B) Rinosinusite fúngica de seio etmoidal anterior.
  - (C) Epistaxe anterior volumosa refratária ao tamponamento nasal.
  - (D) Carcinoma espinocelular de seio maxilar.
  - (E) Complicação orbitária de rinosinusite Chandler V.
- 36.** O tratamento cirúrgico endonasal das fístulas liquóricas nasais requer alguns cuidados, entre eles:
- (A) realização da manobra de Valsalva ao término do procedimento para verificar a eficácia do enxerto locado.
  - (B) o uso da fluoresceína de alta densidade, que facilita a passagem do corante e auxilia na identificação da área lesada.
  - (C) a cabeceira da maca cirúrgica deve estar sem elevações, evitando a perda de fluoresceína rapidamente.
  - (D) o uso de múltiplas camadas para fechamento da fístula deve ser evitado, pois isso dificulta a cicatrização do local.
  - (E) a fixação do enxerto pode ser no ponto de drenagem ósseo ou na abertura meníngea.
- 37.** Para a realização de um Draf IIA na cirurgia endoscópica de acesso ao seio frontal, é fundamental:
- (A) identificação das fibras do nervo olfatório.
  - (B) remoção do frontal beak de ambos os lados das fossas nasais.
  - (C) abertura do assoalho do seio frontal entre a lâmina papirácea e o septo nasal.
  - (D) realização de janela septal posterior.
  - (E) remoção completa do agger nasi.
- 38.** A dessensibilização à aspirina pode trazer melhora na qualidade de vida dos pacientes com rinosinusite crônica e polipose nasal.
- O melhor momento para sua realização é
- (A) antes e após o procedimento cirúrgico, quando indicado.
  - (B) após a realização do procedimento cirúrgico, quando indicado.
  - (C) nas semanas que antecedem o procedimento cirúrgico, quando indicado.
  - (D) assim que ocorre o diagnóstico da doença.
  - (E) associada ao uso de imunobiológicos.
- 39.** Uma vez realizada a suspeita clínica de rinosinusite fúngica invasiva, o exame complementar com maior sensibilidade para o diagnóstico precoce e complicações é
- (A) tomografia computadorizada.
  - (B) rinomanometria.
  - (C) ressonância magnética.
  - (D) cintilografia óssea.
  - (E) provas inflamatórias.
- 40.** Criança de 5 anos com obstrução nasal crônica e rinorreia recorrente. Na nasofibrosopia, identificaram-se lesões polipoides em ambas as narinas, além de secreção mucopurulenta em meatos médios.
- Qual dos exames a seguir deve ser solicitado?
- (A) Ressonância magnética de encéfalo e biópsia.
  - (B) Ressonância magnética de encéfalo e provas reumatológicas.
  - (C) Tomografia de seios paranasais e sorologias infecciosas.
  - (D) Mielograma e teste de cloro no suor.
  - (E) Tomografia de seios paranasais e pesquisa genética para CFTR.



41. Espirros e rinorreia podem ser considerados uma resposta nasal normal em indivíduos expostos ao frio ou ao ar poluído. Clinicamente, uma das formas de se diferenciar essa resposta normal da rinite vasomotora é que, na doença, os sintomas duram
- (A) menos de 30 minutos por dia, por pelo menos 5 dias, durante um período de 14 dias.
  - (B) mais de 1 hora por dia, por pelo menos 3 dias, durante um período de 14 dias.
  - (C) mais de 1 hora por dia, por pelo menos 2 dias, durante um período de 7 dias.
  - (D) mais de 1 hora por dia, por pelo menos 5 dias, durante um período de 14 dias.
  - (E) mais de 1 hora por dia, por pelo menos 3 dias, durante um período de 7 dias.
42. Com relação as mucocelas das cavidades nasossinais, é correto afirmar:
- (A) cursam com remodelamento e destruição óssea, podendo atingir órgãos adjacentes.
  - (B) os seios maxilares são os mais acometidos, seguidos pelos seios fronto-etmoidais.
  - (C) são formadas por epitélio ciliar e ocupam completamente o seio acometido.
  - (D) homens são mais acometidos que mulheres, tendo importante associação a níveis hormonais.
  - (E) são mais comuns nas primeiras décadas de vida pela elevada associação com outras malformações.
43. O sinal de Holman-Muller ocorre em qual das doenças a seguir?
- (A) Mucocele maxilar.
  - (B) Rinossinusite fúngica invasiva.
  - (C) Nasoangiofibroma.
  - (D) Papiloma invertido.
  - (E) Carcinoma espinocelular maxilo-etmoidal.
44. Criança de 2 anos realiza nasofibrolaringoscopia, identificando paralisia de ambas as pregas vocais em posição paramediana. O exame que deve ser prontamente realizado e a hipótese diagnóstica mais comum são, correta e respectivamente:
- (A) eletromiografia laríngea – disfunção espástica muscular.
  - (B) ressonância de encéfalo – Arnold-Chiari.
  - (C) tomografia da coluna torácica – trauma de parto.
  - (D) ecocardiografia – malformações cardiovasculares.
  - (E) avaliação do fundo de olho – lesão do núcleo ambíguo.
45. Mulher de 25 anos com dificuldade respiratória, estridor que piora ao deitar e cansaço, sem disfonia. Laringoscopia mostrou movimentação paradoxal das pregas vocais durante a inspiração. Durante a manobra de *sniff*, houve abertura total das pregas vocais.
- Nesse caso, é fundamental:
- (A) realizar fortalecimento dos músculos extrínsecos da laringe.
  - (B) pesquisar sintomas associados ao Parkinson.
  - (C) instituir tratamento com relaxantes musculares.
  - (D) realizar a tireoplastia como primeira linha de tratamento.
  - (E) realizar eletromiografia laríngea para avaliar músculos adutores.
46. Segundo a classificação de Myer-Cotton para estenoses subglóticas, o comprometimento entre 70 e 90% da área é chamado de grau
- (A) II.
  - (B) IV.
  - (C) I.
  - (D) V.
  - (E) III.
47. Com relação às técnicas de redução da produção de saliva para pacientes disfágicos, assinale a alternativa correta.
- (A) A radioterapia é um método eficaz em quadros mais graves com baixo risco de complicações.
  - (B) A ressecção das glândulas parótidas é padrão-ouro para o controle da produção salivar.
  - (C) A miotomia do músculo cricofaríngeo é indicada na presença de hipotonia do componente parassimpático faríngeo.
  - (D) A parassimpatectomia pode ser realizada através da secção do nervo corda do tímpano e do nervo de Jacobson.
  - (E) A toxina botulínica deve ser aplicada apenas na glândula parótida devido ao elevado risco de lesão em glândulas menores.
48. A cordectomia total é a ressecção da prega vocal até qual parâmetro anatômico?
- (A) Ligamento vocal.
  - (B) Plano do músculo vocal.
  - (C) Pericôndrio da cartilagem cricoide.
  - (D) Prega vestibular.
  - (E) Pericôndrio da cartilagem tireóidea.

49. Assinale a alternativa que descreve adequadamente uma lesão de prega vocal e seu achado anatomopatológico.
- (A) Sulco estria maior: desorganização do epitélio da prega vocal com união deste ao ligamento vocal.
  - (B) Cisto epidermoide: revestido por epitélio estratificado, contém queratina e cristais de colesterol.
  - (C) Papiloma: epitélio pseudoestratificado desorganizado com bolsas ricas em neutrófilos.
  - (D) Sulco bolsa: forrada por epitélio pseudoestratificado colunar, com descamação no seu interior e sendo possível de desenvolver processos inflamatórios ou infecciosos.
  - (E) Ponte mucosa: epitélio estratificado rico em queratina e glândulas mucosas.
50. Homem de 60 anos com quadro de disфонia caracterizada por diminuição da loudness, fala monótona, voz rouca e soprosa. Laringoscopia mostra movimento simétrico das pregas vocais com fenda fusiforme e tremor no repouso vocal.
- O diagnóstico desse paciente é classificado como disфонia neurológica
- (A) rítmica.
  - (B) paroxística.
  - (C) hipocinética.
  - (D) espástica.
  - (E) arritmica.
51. Criança com lesão na linha média da face anterior do pescoço. Após quadro gripal, notou aumento importante da lesão, que se eleva no pescoço quando a criança realiza a protrusão da língua.
- A cirurgia para ressecção dessa lesão deve
- (A) realizar marsupialização completa.
  - (B) retirar a parte central do osso hioide.
  - (C) realizar incisão em quilha na cartilagem tireóidea.
  - (D) preencher o trajeto da lesão com ácido hialurônico.
  - (E) fixar o plano muscular na cartilagem cricóidea.
52. Nos casos de câncer de laringe dos tipos T1 e T2 com pescoço negativo para linfonodos acometidos, o esvaziamento cervical depende do sítio primário da lesão, sendo indicado:
- (A) Esvaziamento cervical seletivo homolateral nas lesões T2 infraglóticas.
  - (B) Esvaziamento cervical seletivo homolateral nas lesões T2 glóticas.
  - (C) Preservação de linfonodos cervicais das lesões T1 e T2 infraglóticas.
  - (D) Preservação dos linfonodos nas lesões T1 e T2 das lesões supraglóticas.
  - (E) Esvaziamento cervical seletivo bilateral nas lesões T1 e T2 supraglóticas.
53. Com relação aos tumores malignos nasossinusais, assinale a alternativa correta.
- (A) O principal sintoma dos tumores de fossa nasal é a obstrução nasal unilateral.
  - (B) O diagnóstico precoce dos tumores sinusais é comum, visto que a doença é muito sintomática.
  - (C) A localização mais frequente de origem é a fossa nasal, e não os seios paranasais.
  - (D) A incidência é maior em mulheres na quarta década de vida.
  - (E) Tumores epiteliais indiferenciados são o tipo histológico mais comum.
54. O exame padrão-ouro para o diagnóstico do despertar relacionado ao esforço respiratório (RERA) é:
- (A) polissonografia *split-night*.
  - (B) sonoendoscopia.
  - (C) oximetria de noite inteira.
  - (D) avaliação de múltiplas latências.
  - (E) polissonografia com balão de pressão esofágica.
55. Durante a polissonografia, os seguintes eventos podem ser avaliados:
- (A) despertar associado ao aumento do esforço respiratório (DRFR): caracterizado pelo despertar com aumento do esforço respiratório decorrente de uma hipopneia.
  - (B) hipopneia: diminuição do fluxo aéreo acima de 50% do basal associada por mais de 10 segundos.
  - (C) despertar associado ao aumento do esforço respiratório (DRFR): caracterizado pelo despertar decorrente do movimento de pernas durante sono profundo.
  - (D) hipopneia: diminuição do fluxo aéreo acima de 30% do basal associada à queda acima de 4% de SpO<sub>2</sub> por mais de 10 segundos.
  - (E) apneia: caracteriza-se pela diminuição do fluxo aéreo em, no mínimo, 8%.

- 56.** Mulher de 32 anos notou, há 3 semanas, uma linha branca superficial em ambas as mucosas jugais, sem dor ou sangramento. Dentição em bom aspecto, assim como língua e palato.
- Quanto à orientação que precisa ser dada nessa situação, assinale a alternativa correta.
- (A) Observar a presença de lesões com a mesma característica em região genital.
  - (B) Solicitar avaliação com dentista e controle de bruxismo.
  - (C) Solicitar avaliação com pneumologista pelo risco de acometimento pulmonar.
  - (D) Limpeza da cavidade oral e uso de antifúngico tópico.
  - (E) A realização de biópsia é importante por se tratar de lesão persistente por mais de 15 dias.
- 57.** Homem de 42 anos que trabalha como salva-vidas em uma praia refere áreas ressecadas no lábio inferior com uma pequena área mais esbranquiçada, atrófica e escamosa, indolor ao toque, que vem aumentando na transição com a pele. Nega tabagismo. O diagnóstico principal e a conduta mais adequada são, respectivamente:
- (A) queilite actínica – biópsia, proteção solar e seguimento clínico.
  - (B) queilite actínica – proteção solar, crioterapia e pomada de corticoide.
  - (C) carcinoma espinocelular – proteção solar, crioterapia e exames laboratoriais.
  - (D) queilite traumática – biópsia, laser de CO<sub>2</sub> e vitamina A.
  - (E) queilite traumática – proteção solar, pomada de corticoide e evitar trauma.
- 58.** Com relação às lesões melanocíticas da cavidade oral, assinale a alternativa correta.
- (A) A síndrome de Laugier-Hunziker é uma hiperpigmentação oral associada à hipopigmentação das unhas.
  - (B) A região mais acometida pelo melanoma na cavidade oral é o lábio inferior.
  - (C) A síndrome de Peutz-Jeghers é caracterizada por manchas castanho-claras e enegrecidas.
  - (D) A pigmentação melânica étnica é associada diretamente à etnia afrodescendente.
  - (E) Na doença de Addison gera máculas planas por toda a cavidade oral por alteração da função tireoideana.
- 59.** Faz parte do critério diagnóstico da síndrome de Sjogren primária:
- (A) coloração ocular em ao menos 3 pontos em pelo menos 1 olho.
  - (B) anti Ro, FAN e anti-SSA positivos.
  - (C) glândula salivar labial com infarto vascular em 1 foco a cada 4 mm.
  - (D) taxa de fluxo salivar não estimulado menor que 0,5 mL/min.
  - (E) teste de Shirmer menor ou igual a 5 mm/5 min em pelo menos 1 olho.
- 60.** Homem de 35 anos sofreu queda de cerca de 3 metros, com trauma da região frontal do crânio com fratura associada. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta com relação ao tratamento dessa fratura.
- (A) Se houve fratura da parede posterior, a cranialização do seio é conduta mandatória.
  - (B) Se houve fratura da parede posterior com lesão menor que 25% da sua extensão, realiza-se a obliteração do seio e ducto nasofrontal.
  - (C) Se houve apenas fratura da tábua externa sem deslocamento dos fragmentos ósseos, a cirurgia por acesso endoscópico é a melhor opção.
  - (D) Se houve apenas fratura da tábua externa, mesmo com deslocamento dos fragmentos ósseos, a conduta é expectante.
  - (E) Se houve apenas fratura da tábua externa com deslocamento dos fragmentos, a conduta é a obliteração do seio frontal, além da correção óssea.

